건강한 잇몸을 위하여

제노타 캡슐
Genota Caps.

일반의약품 | 분류번호:231

잇몸질환(치주질환)은 치아 주위의 잇몸과 치아를 지지하는 치조골에 발생하는 질환을 말하며, 흔히 풍치라고 합니다. 잇몸질환은 구강내에서 발생하는 충치와 함께 가장 흔한 치과 질병으로 대개 30대 이상의 성인에게 많이 생기는데, 그 증상으로는 잇몸이 붓거나 피가 나고 고름이 고이거나 구취가 심하게 나며 치아가 들뜨고 흔들리며 결국 이가 빠지게 됩니다.

잇몸질환의 원인은 국소적으로는 음식물 찌꺼기와 구강내 세균이 결합하여 치아 표면에 생성된 치태(프라그)가 주된 원인이며, 전신적으로는 신체가 다른 질병에 시달리거나 영양상태가 불량할때도 나타납니다.

제노타캡슐에 함유되어 있는 소염효소제 염화리소짐은 세균의 세포벽을 녹이는 성분으로서 세균을 사멸시켜 잇몸염증을 근본적으로 치료해주며, 동클로로필린나트륨은 지속적으로 염증부위를 청정화하고, 탈취·살균작용을 발휘하여 잇몸질환으로 인한 불쾌한 구취를 제거해줍니다. 또한 잇몸을 튼튼하게 하고 출혈을 방지하는 아스코르빈산, 잇몸조직의 혈행을 촉진시키는 초산토코페롤이 이상적으로 배합된 제노타캡슐은 잇몸질환에 따르는 제증상을 효과적으로 치료해 줍니다.

성 상

흑청색의 입상물 및 회백색의 분말이 든 상, 하 암청색의 경질캡슐제

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중

염화리소짐(식품의약품안전청고시) ····· 30mg(역가)
제피아스코르빈산(식품의약품안전청고시) ····· 156.25mg
(아스코르빈산으로서 150mg)
초산토코페롤 50%(식품의약품안전청고시) ····· 60mg
(초산토코페롤로서 30IU)
동클로로필린나트륨(식품의약품안전청고시) ····· 20mg

효능 및 효과

치은염·치조농루에 의한 여러 증상(잇몸의 발적·부기·출혈·고름 등)의 완화

용법 및 용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 복용

포장단위

60, 120캡슐

저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

⬇ 뒷면계속

ISO 9001인증업체 | KGMP 적격업체

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

·본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
·인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr
·공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
·수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
   2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들어 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)의 병력이 있는 환자
   3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용
   1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
   2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
3. 일반적 주의
   1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
   2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
   3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.
4. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
  만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국이나 본사 및 각 영업소에서 교환하여 드립니다.
* 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

문안작성일 : 2003. 6. (Rev. 4)