분류번호:234	일반의약품

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 신장애 환자(심한 신기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
   2) 설사환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 심기능 장애 환자　　2) 고마그네슘혈증 환자
3. 부작용
   1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있다.
   2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
4. 일반적 주의
   마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사한다.
5. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
   2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
   3) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알카리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

보험용

제산 · 완화제

마로겔 정 500mg

(수산화마그네슘)

1000 정

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

ISO9001인증업체 | KGMP적격업체

[성　　상] 흰색의 원형 정제

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

수산화마그네슘(USP) ---------- 500mg

[효능 및 효과]

- 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다
- 변비증

[용법 및 용량]

- 성인
  1) 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 수산화마그네슘 1일 1~2.5g을 수회 분할 경구투여한다.
  2) 변비증 : 1일 1~2g을 1~2회 분할 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[저 장 방 법] 밀폐용기

※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

Rev.3

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :

본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지://www.choa.co.kr

8 806052 140235