전문의약품

새로운 대장근육기능이상 치료제

브록탄정 20mg 40mg

Octylonium Bromide

불규칙한 식생활, 불안, 긴장, 스트레스, 흡연, 음주, 자극성 기호식품 등의 과다한 섭취 등에 따른 뇌신경 및 자율신경 중추의 자극으로 인하여 나타나는 기능성 장질환을 과민성 대장 증후군이라 하는데 주로 복통, 설사, 변비, 복부불쾌감 및 복부팽만감 등의 증상을 보이며 정신적 스트레스를 많이 받는 20대~50대의 정신근로자와 주부들에게 특히 많이 나타납니다.

브록탄정은 위·장의 평활근에 선택적으로 작용하는 약물로서 위·장관 기능이상을 신속히 정상화시켜 과민성 대장증후군을 비롯한 위장관경련증 및 기능저하증에 우수한 치료효과를 발휘하는 제제입니다.

원료약품의 분량 1정중

브롬화옥틸로늄(Octylonium Bromide) ……	(식약청고시 98-127호) ……	20mg
브롬화옥틸로늄(Octylonium Bromide) ……	(식약청고시 98-127호) ……	40mg

약 리 작 용

1. **브록탄정**은 투여30분 후부터 통증을 개선시킬 뿐만 아니라 일단 진정작용이 시작된후에는 지속적으로 효과를 나타냄으로써 위장관경련증 및 기능저하증과 배변습관의 변화, 복통 등의 과민성 대장증후군에 치료효과를 나타냅니다.
2. **브록탄정**은 히스타민 또는 $Bacl_2$로 유발시킨 기니아피그의 회장경련에 대해 Butylscopolamine 보다 85~154배 강한 진경작용을 나타냅니다.
3. **브록탄정**은 과민성 대장증후군 또는 위장경련증 및 기능저하증 환자에 투여시 평균 95%의 치료 효과가 있습니다.
4. **브록탄정**은 위장관의 평활근 세포 내로의 Ca^{++}유입을 억제하는 위장관 근육 선택성 진경작용을 하며 기타 자율신경계에는 작용하지 않으므로 구갈, 현기증, 서맥, 배뇨장해, 위액분비감소 등의 전신적인 항콜린성 부작용이 없습니다.

효능 · 효과

위장관 경련 및 과민성대장증후군

용법 · 용량

성 인 : 브롬화옥틸로늄으로서 1회 20 - 40mg을 1일 2 - 3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   녹내장환자.

저장방법 밀폐용기, 실온보관

포장단위

20mg 정 : 60, 100, 180, 200, 500, 1000정
40mg 정 : 60, 100, 180, 200, 500, 1000정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

제조발매원
영풍제약주식회사
인천광역시 남동구 남촌동 621-9

원료공급원
ORCHIMIE S. A
France