

● 골격근이완제

분류번호 : 122

전문의약품

하원바클로펜정

■ 성분 · 함량 : 1정 중

바클로펜(약전) 10mg

■ 성 상 : 백색의 원형 정제

■ 효능 · 효과 :

1. 다발성 경화증, 척추소뇌변성증으로 인한 골격근의 경직
2. 척수질환(염증성, 퇴행성, 외상성, 신생성, 원인불명 등)으로 인한 경직(예 : 경직성 척수마비, 근위축성 축색경화증, 척수공동증, 횡단성척수염, 외상성하지마비, 척수의 압박증, 기타의 척수병 등)
3. 대뇌 원인으로 인한 경직 : 특히 뇌성마비, 뇌혈관 사고, 신생성 뇌질환, 퇴행성 뇌질환 등이 있는 경우

■ 저장방법 : 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

BACLOFEN

500 정

■ 용법 · 용량 :

이 약의 치료는 항상 저용량으로 시작하며, 점차 증량합니다. 최적용량은 간대성경련, 굴근 및 신근의 강직, 경련 등이 감소되고 가능한, 부작용을 피할수 있는 양으로 환자에 따라 개별적으로 설정되어야 합니다.

과도한 근위약과 넘어짐을 방지하기 위해, 근긴장이 직립 자세 및 운동의 균형을 유지하는데 필요하고 또한 기능유지에 사용되는 경우에는 주의하여 사용하도록 합니다. 어느 정도의 근긴장이 유지되고 순화기능이 수행되는데 도움이 될 만한 일시적 연축은 가능하도록 하는 것이 중요합니다.

이 약은 소량의 물과 함께 식사중 투여합니다.

1일 용량은 성인의 경우 1일 3회, 소아의 경우 1일 4회로 분할하여 경구투여합니다.

• 성인

- 1) 바클로펜으로서 1회 5mg 1일 3회 경구투여하고 최적용량이 정해질 때까지 3일간격으로 1일 3회, 1회 5mg씩 증량합니다.
- 2) 이 약에 과민증 환자는 더 적은 용량(1일 5-10mg)으로 시작하여 천천히 증량하는 것이 좋습니다.
- 3) 최적용량은 보통 1일 30-80mg입니다. 입원환자는 철저한 감독하에 1일 100-120mg을 투여할 수 있습니다.

• 소아

- 1) 12-24개월의 소아 : 1일 10-20mg을 투여합니다.
 - 2) 2-10세의 소아 : 1일 30-60mg을 투여합니다.
 - 3) 약 1-2주 간격으로 개개인의 요구량에 적합하게 될때까지 조심스럽게 증량합니다.
- 10세 이상의 입원환자는 철저한 감독하에 1일 최대 체중 kg당 2.5mg을 넘지 않도록 합니다.

최대용량 투여 이후 6-8주안에 뚜렷한 치료효과가 나타나지 않으면 이 약의 계속 투여여부를 재고합니다.

<주의-부작용>

※엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병·의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.


HW0307



8 806 106 902628

• 제조번호 :

• 사용기한 :



푸식하원제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

