●광범위 Cephalosporin계 항생제

분류번호 : 618

전 문 의 약 품

하원 세파드록실캡셀 500mg

■성분 · 함량 : 1캡셀 중

세파드록실(항기) ····· 500mg(역가)

■성　　상 : 백색의 분말이 든 상적자색, 하백색의 경질 캡셀제

■효능 · 효과 :

1. 유효균종 : 베타용혈성연쇄구균, 포도구균,(페니실리네이스생성균 포함), 폐렴구균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 클레브시엘라속
2. 적응증 : 주효능 효과 - 신우신염, 방광염, 요도염, 피부 및 피부조직감염증, 인두염, 편도염

■저장방법 : 기밀용기, 실온보관　　〈주의-부작용〉

CEFADROXIL

500mg　　100 캡셀

■용법 · 용량 :

1. 성인

1) 요로감염증 : 단순성 하부 요로감염증(방광염등)에는 세파드록실로서 1일 1~2g(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여합니다. 기타 요로감염증에는 1일 2g(역가)을 2회 분할 경구투여합니다.

2) 피부 및 피부조직감염증 : 1일 1g(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여합니다.

3) 인두염, 편도염 : 그룹 에이 베타 용혈성연쇄구균에 의한 인두염, 편도염은 1일 1g(역가)을 1회 또는 2회 분할하여 10일간 경구투여합니다.

2. 어린이

1) 요로감염증, 피부 및 피부조직감염증 : 1일 체중 kg당 30 mg(역가)을 2회 분할 경구투여합니다.

2) 인두염, 편도염 : 1일 체중 kg당 30mg(역가)을 1회 또는 2회 분할 경구투여합니다. 베타 용혈성 연쇄구균감염증에는 적어도 10일간 복용합니다.

3. **신장애환자** : 신손상환자의 경우 세파드록실의 용량은 약물축적을 방지하기 위해 크레아티닌 청소율에 의해 조절되어야 합니다. 다음의 투여계획이 추천됩니다. 즉, 성인의 초기용량은 1g(역가)이며, 유지량은 크레아티닌 청소율(ml/min/1.73m²)을 기초로 하여 아래의 시간 간격으로 500 mg(역가)입니다.

크레아티닌 청소율	투여간격
0-10ml/min	36시간
10-25ml/min	24시간
25-50ml/min	12시간

크레아티닌 청소율이 분당 50ml이상인 환자들은 정상 신장 기능을 가진 환자의 경우와 같이 치료할 수 있습니다.

※엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병·의원 등의 개설자에 한하여 교환하여드립니다.　HW 0111

8 806106 904271

• 제조번호 :

• 유효기한 :

주식회사 하원제약
경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

KGMP