중추성 근이완제

아프레스트정

(아플로쿠알론)

분류번호:119

전 문 의 약 품

■원료약품의 분량 : 1정중

아플로쿠알론(일본약전)..... 20mg

■성 상 : 백색의 원형 당의정

■효능 · 효과

1. 다음 질환으로 인한 근긴장상태의 개선 : 경견완증후군, 요통증
2. 다음 질환으로 인한 경성(經性)마비 : 뇌혈관장애, 뇌성마비, 경성척수마비, 척수혈관장애, 경부척추증, 후종인대(後從靭帶)골화증, 다발성 경화증, 근위축성 측색경화증, 척수소뇌변성증, 외상후유증(척수손상, 두부외상), 수술후 후유증(뇌 척수종양을 포함), 기타 뇌척수질환

■용법 · 용량

성인 : 아플로쿠알론으로서 1회 20mg 1일 3회 경구투여합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■저장방법 : 차광기밀용기

AFREST

1000정

■사용상의 주의사항

1. 부작용 1) 정신신경계 : 때때로 비틀거림, 어지러움, 졸음, 드물게 두통, 두중 등이 나타날 수 있습니다. 2) 소화기계 : 때때로 구역, 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 드물게 구토, 설사, 구갈, 변비, 복부팽만감, 위염 등이 나타날 수 있습니다. 3) 피부 : 드물게 광선과민증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 4) 과민증 : 때때로 발진, 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 합니다. 5) 기타 : 때때로 무력감, 권태감, 드물게 부종, 이명, 빈뇨, 구내염이 나타날 수 있습니다. 2. 일반적 주의 : 졸음, 반사운동능력 저하 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다. 3. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다. 2) 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중에는 투여를 피하고 부득이한 경우에는 수유를 중단합니다. 4. 소아에 대한 투여 : 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적다.) 5. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

※ 엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병·의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

HW 0303

8 806106 902116

주식회사 하원제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

KGMP

· 제조번호 :

· 사용기한 :