H. pylori 항균성 위 · 십이지장궤양 치료제

| 분류번호 : 232 |
| --- |
| 전 문 의 약 품 |

# 헤리놀정

(구연산비스마스칼륨)

■**원료약품의 분량** : 1정 중
구연산비스마스칼륨(식약청고시)·····300mg

■**성　　상** : 백색의 원형 필름코팅정

■**효능 · 효과**
위궤양, 십이지장궤양

■**용법 · 용량**
성인 : 구연산비스마스칼륨으로서 1회 600mg, 1일 2회 아침, 저녁 식전 30분에 경구투여합니다. (깨물어서는 안되며 소량의 물로 삼킵니다.)
또한, 1회 300mg, 1일 4회 식전 30분 및 저녁식후 2시간에 투여할 수도 있습니다. 이 약 투여 전후 30분 동안은 음식물이나 음료수를 섭취 해서는 안됩니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■**저 장 방 법** : 기밀용기

# HERINOL

1000정

■**사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   신장애 환자
2. 부작용
   1) 치료초기에 드물게 동통, 구역, 구토, 위장작열감 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 황화비스마스의 형성에 의하여 대변이 변색 또는 검은색으로 변할 수 있습니다.
3. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 마십시오.
   2) 제산제에 의해 효과가 감소될 수 있으므로 이 약 투여 전후 30분 동안에는 제산제를 투여하지 마십시오.
4. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 좋습니다.
5. 수유부에 대한 투여
   투약중에는 수유를 하지 않도록 주의하십시오.
6. 소아에 대한 투여
   소아에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

※ 엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병 · 의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
HW 0309

8 806106 902277

주식회사 하원제약
경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

KGMP

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :