항바이러스제

분류번호 : 629

전 문 의 약 품

하원 아시클로버정200mg

■**원료약품의 분량 :** 1정 중

아시클로버 (B.P) ·····200mg

■**성 상 :** 연한 청색의 원형 정제

■**효능 · 효과**

1. 초발성 및 재발성 생식기 포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진바이러스 감염증의 치료 및 예방
2. 대상포진 감염증의 치료. 특히 급성시의 통증에 효과가 있습니다. 반면 포진후 신경통에 대한 효과는 아직 증명되지 않았습니다.
3. 2세 이상 소아의 수두치료

■**용법 · 용량**

1. 성인 1) 단순포진바이러스 감염증의 치료 ①1일 5회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용하십시오. ②투여는 5일간 계속하며 중증 초발성 감염증의 경우, 치료를 연장해야 합니다. ③중증 면역기능 저하환자(골수이식후 등) 또는 소화관 흡수장애 환자에는 1회 아시클로버로서 400mg 까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있습니다. ④투여는 감염후 빠를수록 좋으며, 재발성인경우 전구증상이나 병변이 처음 나타날 때 투여하는 것이 좋습니다. 2) 면역기능이 정상인 환자의 단순포진 감염증의 예방 ①1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용하십시오. ②1일 2회, 1회 아시클로버로서 400mg씩 12시간 간격으로 복용할 수도 있습니다. ③용량추정은 1회 아시클로버로서 200mg을 1일 2-3회 투여해 봄으로써 유효성을 더 정확히 알아낼 수 있습니다. ④장기치료 환자에게 계속적 억제기능의 유무를 재평가하기 위해서는 매 6-12개월 간격으로 주기적으로 치료를 중단해야 합니다. 3) 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방 ①1일 4회, 1회 아시클로버로서 200mg씩 약 6시간 간격으로 복용해야 합니다. ②중증 면역기능저하환자(골수이식후 등) 또는 소화기관 흡수장애 환자에는 1회 아시클로버로서 400mg까지 증량하거나 정주요법으로 바꿀 수 있습니다. ③감염 위험 기간 동안 투여합니다. 4) 대상포진 감염증의 치료 ①1일 5회, 1회 아시클로버로서 800mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 복용하며, 투여는 7일간 계속합니다. ②중증 면역기증 저하환자 또는 소화관으로 부터 흡수가 잘 안되는 환자의 경우 정맥주사가 좋습니다. ③투여는 감염후 빠를수록 좋으며 발적이 나타난 후 빨리 치료하면 할수록 더 좋은 효과가 나타냅니다. 2. 소아 1) 단순포진 감염증의 치료 및 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방 ①2세 이상 : 성인에 준함. ②2세 미만 : 성인용량의 ½을 투여. 2) 면역기능 정상환자의 단순포진바이러스 감염증의 예방에 대한 확실한 자료는 아직 없습니다. 3) 2세 이상 소아의 수두치료 1회 체중kg당 아시클로버로서 20mg (800mg을 초과하지 않도록)씩 1일 4회, 5일간 투여합니다. 치료는 수두발진이 나타난 후 빠를수록 좋으며 가급적 발진후 24시간이내에 투여합니다. 3. 신장기능 장해환자 1) 단순포진 감염증의 치료 ①경구적으로 권장할 수 있는 용량은 정맥주사 때의 혈중농도 보다 더 높지 않는 것이 좋습니다. ②그러나 심한 신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10㎖/min 미만인 자)에는 12시간마다 아시클로버로서 200mg씩 투여하는 것이 좋습니다. 2) 대상포진 감염증의 치료 .심한 신장기능 손상환자(크레아티닌 클리어런스치가 10㎖/min 미만인 자)의 경우 1회 아시클로버로 서 800mg을 1일 3-4회, 약 6-8시간 간격으로 투여하는 것이 좋습니다. 4. 노인 1) 노인의 경우 총 아시클로버 클리어런스치가 크레아티닌 클리어런스치와 더불어 감소하기 때문에 아시클로버를 많이 복용한 노인환자에 있어서는 적절한 수분을 공급해 주어야 합니다. 2) 신장장해가 있는 노인환자에 있어서 용량감소에 대해서는 특별한 주의를 해야 합니다.

■**저장방법 :** 기밀용기, 25℃ 이하에서 건소보관

ACYCLOVIR

200mg 300정

■**사용상의 주의사항**

1.다음 환자에는 투여하지 마십시오. 이 약에 과민증의 전력이 있는 환자. 2.다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 1) 신기능 장해환자 2) 소아 3. 부작용 1) 정신신경계 : 드물게 졸음, 현운이 나타날 수 있습니다. 2) 신장 : 때때로 BUN상승 및 뇨침전물중에 적혈구가 나타날 수 있습니다. 3) 혈액 : 때때로 백혈구 감소 또는 증가, 호산구증다 등이 나타날 수 있습니다. 4) 간장 : 간기능 검사치의 이상(때때로 GOT, GPT, LDH, AL-P, 총 빌리루빈치 상승)이 나타날 수 있습니다. 5) 소화기 : 때때로 설사, 심와부통, 위통, 구역, 구토 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오. 6) 피부 : 때때로 발진, 수포, 두드러기양 홍반, 두드러기가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오. 7) 전신증상 : 때때로 전신권태감, 드물게 두통이 나타날 수 있습니다. 8) 골격근 : 관절통이 나타날 수 있습니다. 9) 기타 : 때때로 총콜레스테롤치, 트리글리세라이드치, 혈청칼륨치의 상승, 동계가 나타날 수 있습니다. 4.일반적 주의 1) 단순포진의 치료에 있어서 5일간 사용하여 개선의 조짐이 보이지 않거나 악화되는 경우에는 다른 치료로 바꾸십시오. 2) 발병초기에 가까울수록 효과가 기대되므로 조기에 투여 개시하는 것이 바람직합니다. 5. 상호작용 1) 프로베네시드는 아시클로버의 혈장농도 곡선에서 아시클로버의 평균 반감기 및 면적을 증가 시킵니다. 2) 신장기능에 영향을 주는 어떤 약물도 아시클로버의 약물동력학에 실질적 영향을 줄 수 있습니다. 6. 임부에 대한 투여 동물실험에서 최기형성작용이 보고되었기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용하십시오.

※ 엄격한 품질관리하에 제품을 생산하고 있습니다만, 혹시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 및 병·의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. HW 0106

주식회사 하원제약

경기도 평택시 진위면 가곡리 543-3

KGMP

· 제조번호 :

· 사용기한 :

8 806106 902499