

휴온스

포도당 주사액 20%

■ 원료약품의 분량 1mL 중
포도당(약전) 200mg

■ 성상

무색 앰플내의 무색액체 또는 무색 투명한 플라스틱제(폴리프로필렌, 폴리에틸렌) 용기내의 무색액체

■ 효능·효과

1. 고칼륨혈증, 순환허탈, 저혈당시의 에너지 보급
2. 심질환(G.I.K요법) 그 외 수분, 에너지 보급
3. 약물·독물 중독

■ 용법·용량

- 성인 : 1회 20~500 mL 정액주사한다.
 - 정적정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/kg 이하로 한다.
 - 주사제의 용해회석에는 적당량을 사용한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1) 포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민 B1)소모율이 높기 때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있음.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 저장성 탈수증 환자
 - 2) 수분과다상태 환자
 - 3) 고혈당 환자
 - 4) 산증 환자
 - 5) 저칼륨혈증 환자
 - 6) 고상투압성 혼수 환자
 - 7) 내당불내증 환자
 - 8) 무뇨증, 간성혼수 환자
- 9) 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자

분류번호 : 323

- 10) 고장액은 탈수증세가 있는 척추관내출혈, 두개내출혈, 진전성망한자 에게는 투여하지 않는다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 칼륨결핍·인산결핍·마그네슘결핍경향이 있는 환자, 저나트륨혈증 환자
 - 2) 요붕증 환자
 - 3) 신부전 환자
 - 4) 코르티코스테로이드·코르티코트로핀 투여 환자
 - 5) 심부전 환자
 - 6) 심한 영양결핍 환자
 - 7) 치아민결핍 환자
 - 8) 패혈증 환자
 - 9) 중증 또는 외상 환자
 - 10) 심한 탈수·속 상태 환자
 - 11) 혈액희석(hemodilution) 환자
 - 12) 만성노독증 환자
 - 13) 당뇨병 환자
 - 14) 고장성액은 당뇨병, 곡물알러지 환자에는 신중히 투여한다.
4. 이상반응
 - 1) 대량급속 투여에 의해 전해질 상실을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 2) 권장용량을 초과하여 투과할 경우 bilirubin, lactate수치가 높아질 수 있다.
 - 3) 저칼륨혈증, 고장성혼수(hyperosmolar coma), 산증(acidosis)
 - 4) 탈수증, 고상투압증
 - 5) 포도당 검출이 동반되는 당뇨병
 - 6) 정맥주사는 체액 또는 용질과다상태를 유발, 체액전해질 불균형, 열열, 폐 부종을 일으킬 수 있다.
 - 7) 내당불내증환자의 경우 고혈당, 신손실(renal loss)이 일어날 수 있다.

- 8) 열, 정맥염, 혈전증, 혈액의 유출, 주사부위 통증, 요독증
5. 일반적 주의
 - 1) 장기간의 투여는 인슐린 생성에 영향을 미칠수 있다. 이를 낮추려면 인슐린을 함께 투여한다.
 - 2) 수술후, 외상후, 또는 다른 내당불내증이 있는 경우 5%는 혈당조절하에 투여한다.
 - 3) 혈청 전해질 검사를 한다.
 - 4) 수분균형을 고려하여 투여한다.
 - 5) 혈당농도의 조절을 한다
 - 6) 환자상태, 아세톤뇨, 혈중칼륨농도, 혈중인산농도 등의 수치에 유의한다.
6. 임부에 대한 투여
정확한 자료가 없으므로 반드시 필요한 경우만 사용한다.
7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여한다.
8. 과량투여시의 처치
고용량 투여로 인한 고혈당증이나, 당뇨병(glucosuria)발생시 이에 대한 치료로 인슐린을 투여한다.
9. 적응상의 주의
 - 1) 피하 대량 투여에 의해 혈장으로부터 전해질이 이동해서 순환부전을 초래할 수 있고 국소자극이 심하므로 피하주사하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 개봉한 후에는 바로 사용하며, 사용한 잔액은 사용하지 않는다.
 - 3) 용주하는 경우는 감염의 우려가 있으므로 주의한다.
 - 4) 한행기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다.
 - 5) 고장액을 투여하였을 경우 혈전정맥염을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 6) 고농도액 투여의 급격한 중지예 의해 저혈당을 일으킬 수 있다.
 - 7) 가응집반응(pseudoagglutination)이 나타날 수 있으므로 혈액과 동시에 투여

하지 않는다.

- 8) 항생제, 비타민제, 간장액, 진통·진경제, 와파린 등 기타 여러 가지 타 약제를 혼합처방 사용할 때는 이상반응이 나타나는 수가 있으므로 다른 약물의 화학적 물리적 부작용을 충분히 숙지한 다음 신중히 관찰하면서 투여한다.
- 9) 다른 약물을 혼합시 용기 혹은 마개와의 상호작용에 유의하고, 혼합 즉시 사용한다.

■ 저장방법

밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

작성일 : 2006.06.09