

휴온스

안식향산나트륨카페인 주사액

분류번호 : 211

■ 원료약품의 분량 1앰플(2mL) 중

안식향산나트륨카페인(약전) 220mg

■ 성 상

무색 거의 투명한 주사액

■ 효능·효과

1. 척추천자에 의한 두통
2. 알코올 또는 모르핀 중독에 의한 호흡억제시 호흡흥분 보조제

■ 용법·용량

성인 : 안식향산나트륨카페인으로 1회 100~500mg 근육 또는
피하주사한다.

긴급할 경우에는 정맥주사할 수 있다.

소아 : 체중kg당 8mg을 같은 방법으로 주사한다. 필요한 경우 4시간
마다 반복주사한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 위궤양 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 심장애 환자
- 3) 녹내장 환자
- 4) 이 약에 과민증 환자

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 빈맥, 심계항진, 기외수축 등이 나타날 수 있다.
- 3) 중추신경계 : 불면, 흥분, 진전, 어지러움, 동공확대, 섬광안검(Scintillation-Scotoma), 이명 등이 나타날 수 있다.
- 4) 눈 : 만성 녹내장을 악화시킨다는 보고가 있다.
- 5) 기타 : 무력감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

이 약을 과량투여할 경우 우울증 환자를 더욱 우울하게 만들 수 있으므로 1회 용량이 1g을 넘지 않도록 한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

카페인은 태반을 통과하며 모유중으로 쉽게 이행되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 장기 연용을 피한다.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

7. 적용상의 주의

- 1) 정맥주사를 할 경우에는 주사속도를 느리게 한다.
- 2) 주사바늘은 작은 것을 사용한다.

■ 저장방법

밀봉용기

작성일 : 2006.06.13