

휴온스 말레인산클로르페니라민 주사액

Huons Chlorpheniramine Maleate Injection

원료약품의 분량 1mL 중

말레인산클로르페니라민(KP) 2mg

성 상

무색의 액이 들어있는 갈색 앰플 주사제

효능 · 효과

고초열, 두드러기, 소양성 피부질환(습진·피부염, 피부 소양증, 악진, 곤충자상), 알레르기성 비염, 혈관 운동성 비염

용법 · 용량

성인 : 말레인산클로르페니라민으로서 1회 5~10mg 1일 1~2회 피하, 근육 또는 정맥 주사한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

- 경고
 - 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
 - 벤질알코올은 조숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡 증상과 연관이 있는 것으로 보고되었다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 유사 화합물에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 녹내장 환자(항콜린 작용에 의해 안압이 상승되어 녹내장이 악화될 수 있다.)
 - 전립선비대 등 하부요로폐색성 질환 환자
 - 미숙아 및 신생아(벤질알코올을 함유하고 있다.)
 - MAO 저해제 투여중인 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 안내압상승 환자
 - 감상선기능항진 환자
 - 협착성 소화성궤양 또는 유문십이지장 궤색 환자 (항콜린 작용에 의해 평활근의 운동억제, 긴장저하가 일어나 증상이 악화될 수 있다.)
 - 순환기계 질환 환자
 - 고혈압 등 심혈관계 질환 환자
 - 간질 환자
 - 기관지염, 기관지확장증 및 천식 환자
 - 간질환 환자
- 부작용
 - 속이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰을 하고 헛색증, 호흡곤란, 흉부불쾌감, 혈압저하 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 경련, 착란이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나면 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
 - 재생불량성빈혈, 무과립구증이 나타날 수 있으므로 혈액검사를 하여 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 과민증 : 발진, 광선과민증, 박탈성 피부염, 두드러기, 연축, 근허약, 혐조불능이 나타날 수 있다.
 - 중추신경계 : 진정, 졸음, 신경과민, 두통, 초조감, 복시, 불면, 어지러움, 이명, 전정장애, 다행증, 정서 불안, 히스테리, 진전, 신경염, 협조이상, 감각이상,

- 무시, 집중력감소, 관태감이 나타날 수 있다.
- 소화기계 : 구갈, 가슴쓰림, 식욕부진, 소화불량, 구역, 구토, 복통, 변비, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 비뇨기계 : 빈뇨, 배뇨곤란, 요폐, 요저류 등이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 저혈압, 심계항진, 빈맥, 부정맥, 기외 수축, 간염, 황달, 미약맥이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타나는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
 - 호흡기계 : 코 또는 기도의 건조, 기관분비액의 점성화, 천명, 코막힘이 나타날 수 있다.
 - 혈액 : 용혈성빈혈, 혈소판감소가 나타날 수 있다.
 - 투여부위 : 주사부위에 일시적인 자극, 작열감이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 오한, 발한이상, 홍통, 피로감, 월경이상 등이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 상호작용
 - 알코올, 중추신경억제제와 병용투여시 졸음을 유발할 수 있다.
 - 클로르페니라민은 페니토인대사를 억제하여 페니토인 독성을 유발할 수 있다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
 - 이 약이 유즙 분비를 억제하고 모유로 이행될 수 있으므로 수유부에게 투여할 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 소아에 대한 투여
 - 유아 및 소아에 과량투여하면 환각, 흥분, 경련, 사망을 일으킬 수 있으므로 특히 주의한다.
 - 고령자에 대한 투여
 - 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여해야 한다.
 - 과량투여시의 처치
 - 클로르페니라민의 치사량은 체중 kg당 25~50mg이다.
- 증상 : 진정, 중추신경계 비정상적 자극, 중독성 정신병, 경련, 무호흡, 정신착란, 항콜린 효과, 실조증, 부정맥을 비롯한 심혈관계 허탈증 등이 나타날 수 있다.
- 처치 : 심장 · 호흡기 · 신장 · 간장 기능 및 수액 전해질 균형을 특별한 주의를 기울이는 등 대증적 · 지지적인 처치를 하고 중추신경계 경련은 디아제팜 또는 페니토인을 정맥주사하거나 심한 경우에는 혈액관류를 할 수 있다.

저장방법

차광밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

2mL × 10, 50 앰플

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다. 작성일 : 2007.05.12
주식회사 휴온스
본품 및 교환처 : 080-447-4700

경기도 화성시 향남면 상신리 907-6
907-6, Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea

Huons