

휴온스

염화칼륨 주사액

■ 원료약품의분량 20mL 중

염화칼륨(약전) 3g

분류번호 : 331

■ 성 상

무색 투명한 플라스틱제(폴리프로필렌, 폴리에틸렌) 용기내의 무색 액체

■ 효능·효과

1. 주효능 효과 : 저칼륨혈증, 디기탈리스 중독
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다.: 이뇨제 투여후의 저칼륨혈증

■ 용법·용량

염화칼륨으로서 보통 성인은 0.5~3g을 0.3% 용액이나 링겔 또는 포도당 용액에 넣어 분당 8~12mL의 속도로 4시간 이상에 걸쳐 정맥주사한다. 연령, 증상에 따라 적의 증감한다.

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인할 수 있습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 칼륨 축적이 올 수 있는 신장부전, 선천성 심부전증, 부신기능의 장애자
 - 2) 급성 탈수증 또는 광범위한 조직손상(열상 등)등이 있는 환자
 - 3) 소화기 계통의 장애자나 협착이 있는 환자
 - 4) 심장 비대증 환자중 식도에 압박을 받고 있는 환자
 - 5) 심장 수술후의 환자
2. 다음 경우는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신기능 장애 환자 2) 심장질환이 있는 환자
3. 부작용
 - 1) 소화기 : 간혹 소화관 폐쇄, 궤양 또는 천공을 일으킬 수 있으므로 충분한 관찰이 요구되며 구토, 복통, 복부팽만감, 소화관 출혈 등의 증상이 나타날 경우에는 즉시 중지한다. 간혹 구역, 복부불쾌감, 설사 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 심 장 : 일시적으로 대량 투여하면 심장전도 장애를 일으킬 수 있다.
4. 상호작용

고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 항알도스테론제제나 트리암테렌 등의 칼륨 축적성 이뇨제와의 병용을 피할 것.

5. 기 타

- 1) 혈청 전해질, 심전도의 변화에 주의한다.
- 2) 대사성 아시도시스의 경우 저칼륨혈증의 치료는 염기성염에 따라서 행하는 것이 바람직하다.

■ 저장방법

밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

Huons Co., Ltd.

907-6 Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do 445-746, Korea