

오베나신 정 100mg/200mg [오픈룩사신]

Obenasin Tablet 100mg / 200mg

원료약품의 분량 1정 중

· 오베나신정 : 오픈룩사신 (U.S.P.)	100mg
· 오베나신정 200mg : 오픈룩사신 (U.S.P.)	200mg

성상

- 오베나신정 : 백색 내지 미황색의 원형 정제
- 오베나신정 200mg : 백색의 원형 필름코팅정

효능·효과

- 포도구균속, 화농성 연쇄상구균, 용혈성 연쇄상구균, 장구균, 폐염구균, 펠로스트렙토코카스속, 임균, 대장균, 시트로박테르속, 시겔라속, 폐염간균, 엔테로박테르속, 세라치아속, 푸로테우스속, 녹농균, 인플루엔자균, 아시네토박테르속, 캄피로박테르속등 본제 감수성균에 의한 하기감염증.
- 모낭염, 질, 절종증, 응, 단독, 봉소염, 임파관(질)염, 표자, 피하농양, 한선염, 접촉성피장, 감염성 분류, 항문주위농양
 - 유선염, 외상, 열상, 수술창 등의 표재성 이차감염
 - 인후두염, 급성기관지염, 편도염, 만성기관지염, 기관지확장증(감염시), 비만성폐기관지염, 만성호흡기질환의 이차감염, 폐염
 - 신우신염, 방광염, 전립선염, 부고환염, 임균성요도염, 비임균성요도염
 - 당낭염, 담관염
 - 세균성저리, 장염
 - 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르틀린선염
 - 안검염, 맥립종, 누낭염, 검관선염, 각막궤양
 - 중이염, 부비강염

용법·용량

통상 성인 오픈룩사신으로서 1일 300~600mg을 2~3회 분복한다.

단, 감염증의 종류 및 중상에 따라 적의 증감한다.

사용상의 주의사항

- 경고
 - 외과 수술이 필요하거나 무능력 연장을 일으키는 어же, 손, 아킬레스 건파열이 보고되었다. 환자가 통증, 염증, 건파열을 느끼는 경우에는 투여를 중지한다. 건염 또는 건파열이 아님이 확실히 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가한다. 건파열은 이 약 투약중 또는 후 등 언제든지 나타날 수 있다.
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 퀴놀론계 항생물질과 관련된 과민증, 건염, 건파열의 병력이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 중증 신장에 환자
 - 2) 간질 등 경련성 질환 또는 그 병력이 있는 환자
 - 3) 퀴놀론계 항균제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 4) 고령자
- 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 불쾌감, 발한, 호흡곤란, 혈압하하 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 과민증 : 드물게 아나필락시안 증상(홍반, 오한, 호흡곤란), 부종, 두드러기, 열감, 때때로 발진, 가려움 등이 나타나는 경우가 있으므로 그러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 신장 : 드물게 급성 신부전, 때때로 BUN, 크레아티닌 상승이 나타날 수 있다.
 - 4) 간장 : 간기능장애, 드물게 황달, 때때로 AST, ALT, ALP, γ -GTP, 총빌리루빈 상승이 나타날 수 있다.
 - 5) 소화기계 : 드물게 위막성 대장염 등의 혈변을 수반한 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 때때로 구역, 구토, 위-

복부불쾌감, 설사, 경변, 식욕부진, 위복부통 또는 드물게 흉통, 구갈, 구내염 등의 증상이 나타나는 경우가 있다.

- 6) 혈액 : 범혈구감소증, 때때로 빈혈, 백혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크리트 감소, 혈소판 감소, 호산구 증가 등이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지한다.
- 7) 정신신경계 : 때때로 불면, 어지러움, 두통 드물게 경련, 진전, 마비감, 시각이상, 이명, 환각, 졸음 등이 나타날 수 있다.
- 8) 피부 : 드물게 독성성 표피괴사증(리엘증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 9) 근육 : 근육통, 무력감, CPK상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 한 급격한 신 기능 악화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 10) 호흡기계 : 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 한다.
- 11) 기타
 - ① 다른 뉴클레오제 항균제에서 드물게 저혈당이 나타나는(고령자, 특히 신장에 환자에서 나타나는) 수가 있으므로 신중히 투여한다.
 - ② 드물게 권태감, 발열, 심계항진 등이 나타나는 경우가 있다.
- 12) 발작 : 수면장애가 나타날 수 있다.
- 13) 레보프로카사신(유사약)에서 중증 간염이 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정 되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

5. 일반적주의

- 1) 소인이 있는 환자에는 발작 또는 다른 중추신경계 부작용이 나타날 수 있음을 주의시킨다.
 - 2) 통증, 염증, 건파열이 나타날 경우에는 치료를 중지하고 의사에게 알리고 건염 또는 건파열이 아님이 확실히 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가한다.
- ### 6. 상호작용
- 1) 유사 화학물(예복사신 등)에서 펜부펜 등의 페닐초산계 또는 프로피온산계 비스테로이드성 소염 진통제와의 병용에 의해 드물게 경련이 나타났다는 보고가 있다.
 - 2) 알로미늄 또는 마그네슘 함유 제산제와의 병용에 의해 흡수가 저해되고, 효과가 감악되는 경우가 있으므로 병용하지 않는 것이 바람직하다.
- ### 7. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
 - 2) 사람 모유중으로 이행하므로 이 약 투약 중에는 수유를 피하는 것이 바람직하다.
- ### 8. 소아에 대한 투여
- 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 소아에는 투여하지 않는다.
- ### 9. 고령자에 대한 투여
- 이 약은 주로 신장으로 배설되므로, 고령자는 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있으므로 용량에 특히 주의한다.
- ### 10. 기타
- 1) 외국에서 드물게 아킬레스 건염, 건파열 등의 건장애가 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 동물실험(강아지, 어린 캣)에서 관절 이상이 나타났다는 보고가 있다.

저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30, 500 정

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

작성일 이후 변경된 내용은 www.huons.com에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2006.11.22

소비자 상담실(반독 및 교환처) : 080-447-4700

주식회사 휴온스

경기도 화성시 함남면 상신리 907-6
907-6, Sangshin-ri, Hyangnam-myun,
Hwaseong-city, Kyunggi-do, Korea

Huons