

휴온스 염산암브록솔 주사액

분류번호 : 222

■ 원료약품의 분량 1앰플(2mL) 중

염산 암브록솔(KPC) 15mg

■ 성 상

무색의 액상이 충전된 갈색의 앰플제

■ 효능·효과

1. 주요효능 효과

- 1) 점액분비장애로 인한 급만성 호흡기질환 : 만성기관지염, 천식성기관지염, 기관지천식의 급성발작
- 2) 조산아 및 신생아의 호흡곤란증후군
- 3) 수술전·후 폐합병증의 예방 및 치료

■ 용법·용량

o 성인 : 염산암브록솔로서 1회 15mg 1일 2~3회 피하, 근육 또는 천천히 정맥주사한다.

심한 경우 1회 30mg까지 증량할 수 있으며 포도당주사액, 링겔주사액 또는 생리식염주사액과 함께 점적 정맥주사할 수 있다.

o 소아 : 1일 체중 kg당 1.2~1.6mg을 정맥 또는 근육주사한다.

<연령에 따른 투여량>

5세 이상 : 1회 15mg 1일 2~3회

2 ~ 4세 : 1회 7.5mg 1일 3회

2세 미만 : 1회 7.5mg 1일 2회

조산아 및 신생아의 호흡곤란치료는 1일 체중 kg당 10mg을 4회로 분할하여 천천히 정맥주사한다. 단독투여시 체중 kg당 20mg까지 증량할 수 있다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것.

이 약에 과민증 환자

3. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것.

중증 신장애 환자

4. 부작용

1) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위·복부팽만감, 위·복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.

2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창

,

호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다. 극히 드물게 암브록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성 아나필락시스양 반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

3) 호흡기계 : 백혈구증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.

4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.

5. 상호작용

에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임신중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. (특히, 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다.)

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

8. 적용상의 주의

1) 두통, 다리의 통증, 극도의 피로가 나타날 수 있으므로 천천히 주사한다.

2) 피하 또는 근육주사시 혈관, 신경 및 동맥주사부위를 피하고 정맥 주사시는 천천히 주사한다.

3) 침전이 생길 수 있으므로 pH 6.3 이상의 다른 주사액과 혼합하여서는 안된다.

■ 저장방법

작성일: 2006.02.23