

위산과다 · 칼슘보급

씨씨본정

Precipitated Calcium Carbonate 500mg

500정

Huons

일반의약품/분류번호 : 234

▣ 원료약품의 분량 1정 중
침강탄산칼슘 (약전) 500mg

▣ 성 상 백색의 원형 정제

▣ 효능 · 효과

1. 주효능 효과
 - 1) 다음 질환의 재산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다
 - 2) 칼슘보급

▣ 용법 · 용량

- 성인
 1. 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 탄산칼슘으로서 1일 1~5g을 3~4회 분할 경구투여한다.
 2. 칼슘보급 : 1일 1.5~3g을 1~2회 분할 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

▣ 사용상의 주의사항

1. 경고
 - 1일 최대용량 7.5g을 초과하지 않도록 한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 중증 고칼슘혈증 환자 및 중증 고칼슘뇨증 환자
 - 2) 부갑상선기능항진증 또는 갑상선기능저하증 환자
 - 3) 중증 신부전 환자
 - 4) 무산증 또는 위산 결핍증 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 신장장애 환자
 - 2) 심기능장애, 폐기능장애 환자
 - 3) 변비 환자
 - 4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
4. 부작용

- 1) 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 구역, 변비 또는 설사가 나타날 수 있고 드물게 위산의 반동성 분비 등이 나타날 수 있다.
- 2) 대사이상 : 고용량 복용에 의해 고칼슘혈증, 알칼리증이 나타날 수 있다.
- 3) 장기·대량투여 : 신결석, 요로결석이 나타날 수 있다.
- 4) 과민증 : 가려움증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에 투여시킬 때에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
 - 3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
6. 상호작용
 - 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.
 - 2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내·체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 3) 다량의 우유와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 4) 비타민 D, 치아질계 이뇨제와 병용투여시 고칼슘혈증이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

▣ 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

주식회사 휴온스

작성일 : 2004. 05.

경기도 화성시 향남면 상신리 907-6

제조번호 :

사용기한 :