사용설명서

분류번호
222

일반의약품

급 · 만성 기관지염

리나치올®

캅 셀
375mg
(성인용)

L-카르보시스테인
(L-Carbocysteine)

호흡기도란 부비동에서부터 말단 세기관지까지를 말하며, 전부가 점막층으로 덮여 있고, 끊임없이 점액질을 분비하여 외부로부터의 각종 세균이나 바이러스, 먼지, 공해물질 등에서 각 기관들을 보호합니다. 그러나 이러한 점막이나 점액질이 병변을 일으켜 염증이 형성되면, 정상기능을 상실하고 각종 호흡기 및 이비인후질환을 유발하게 됩니다. 이러한 경우에 치료의 급선무는 점막과 점액질의 정상상태를 되찾아 주는 것이 기본으로 되어 있습니다. **리나치올**은 객담을 용해시켜 호흡기능을 정상화하고, 손상된 점막의 생리적 방어기능을 정상화시켜 각종 호흡기 및 이비인후질환을 효과적으로 치료하는 제제입니다.

- 이 약을 사용하시기 전에 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 이 설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 분량] 1캅셀 중
L-카르보시스테인(약전) ····· 375mg

[성　　상] 백색분말이 든 녹색의 캅셀제

[약 리 작 용]
1. 용담작용(Mucolysis)
   리나치올은 기도내 응어리져 있는 고점도상태의 가래를 용해시켜 객담배출을 촉진하므로 호흡기능 장애를 개선합니다.
2. 점막정상화 작용(Mucoregulation)
   리나치올은 점막의 점액질 합성과정에 관여하여 점액의 분비량과 성분조성비를 정상화하여 기관지 섬모운동을 정상화시키고 생리적 방어기능을 부활시켜 줍니다. 또한 점막 단백합성에 필요한 cysteine을 공급하여 손상된 점막의 재생을 촉진합니다.

※ 또한 리나치올은 축농증이나 중이염 등 염증부위의 배농을 촉진하고 항생제 침투력을 증강시킵니다.

[효능 · 효과]
1. 주효능 효과
   1) 다음 질환에서의 객담 배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염, 비인두염
   2) 만성부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

[용법 · 용량]
성인 : L-카르보시스테인으로서 초기에 1회 750mg(2캅셀) 1일 3회 경구투여하고 증상이 호전되면 1회 375mg(1캅셀) 1일 4회 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   위·십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 간장애 환자
   2) 심장애 환자
   3) 위·십이지장궤양의 병력이 있는 환자
3. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부 팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈 등이 나타날 수 있으며 민감한 환자에서 구내염이 나타날 수 있다.
   2) 과민증 : 때때로 발진, 홍반, 습진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
   3) 신경계 : 드물게 두통이 나타날 수 있다.
   4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염이 나타날 수 있다.
   5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진, 콧물, 전신 압박감이 나타날 수 있다.
4. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
5. 수유부에 대한 투여
   수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
6. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
7. 과량투여시의 처치
   과량투여시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.

[포장단위] 60, 100, 300, 500캅셀

[저장방법] 기밀용기, 실온보관

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 오용을 막고, 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른 용기에 넣지 마십시오.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 폐기하여 주십시오.
※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적, 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
※ 이 제품 내용에 대한 문의는 구입처나 다음의 제품 문의처로 문의하십시오.

♣ 제품문의처 : ☎ 080-024-5525(개발부)
첨부문서 개정년월일 : 2002. 10

제조발매원
현대약품공업주식회사
공 장 : 충청남도 천안시 풍세면 남관리 200

0410