

귀뒤에 붙이면 멀미가 예방되는 멀미예방치료제 <일반의약품>

어린이 키미테® - 패취 (8~15세용, 스코폴라민)

Brand of Scopolamine

분류번호: 235

어린이 키미테-패취는 귀뒤에 단 1매 부착으로 72시간(3일)동안 멀미를 방지해주며 내복액에 비하여 위장장애가 없으며 졸리움 등의 부작용을 경감시킨 멀미 방지약입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1매 (12.65밀리그램, 1.25cm) 중 스코폴라민(별규) 0.75밀리그램

【성상】

상부는 얇은 황갈색의 폴리에스테르필름이 알루미늄박층에 부착되어 있으며, 하부는 4각형의 실리코나이즈드 폴리에스테르 테이프가 덮혀있는 얇은 원형의 패취이다.


【약리작용】

1. 어린이 키미테-패취는 피부에 직접 부착함으로써 3일동안 지속적으로 Scopolamine을 방출시킬 수 있도록 만들어진 Programmed Delivery System제제입니다.
2. 임상실험결과 어린이 키미테-패취는 동요병 증상에 대해 효과적인 구토 억제작용을 가지고 있습니다.
3. 어린이 키미테-패취는 두께 0.2mm, 표면적 1.25cm²의 4개의 층으로 구성된 원형의 평평한 disc로서 microporous polypropylene membrane이 있어서 피부로 방출되는 약물의 공급속도를 조절하여 72시간(3일)동안 유효혈중농도가 유지되도록 하여 줍니다.
4. 피부를 통하여 일정량의 Scopolamine이 흡수되어 필요한 만큼의 유효혈중농도를 유지·조절해 줌으로서 경구 투여로 인하여 나타날 수 있는 졸리움, 방향감각이상, 기억력 혼란, 환각, 발적, 홍반, 가려움증 등의 부작용을 경감시켜 줍니다.
5. 어린이 키미테-패취는 Belladonna Alkaloid인 Scopolamine이 중추신경계로 들어오는 내이신경섬유의 말상체에 있는 구토반사중추를 억제함으로써 효과가 나타납니다.
6. 1회 부착으로 효과가 3일동안 지속되므로 장시간 여행 시 반복투여의 번거로움을 덜어줍니다.

【효능·효과】

1. 주효능 효과
멀미에 의한 구역·구토의 예방

【용법·용량】



1. 이 패취는 최소한 4시간 전에 귀뒤의 털이 없는 건조한 피부의 표면에 붙여야 한다.
2. (소아용)
소아(8-15세) : 1회 1매(스코폴라민으로서 0.75mg)의 패취를 사용한다.
7세 이하의 사용하지 않는다.
3. 이 패취를 붙인 후 비누로 손을 깨끗이 씻어야 한다.
4. 패취를 떼어낸 뒤에는 부착했던 부위와 손을 비누로 깨끗이 씻어 이 약의 잔여물이 눈에 들어가는 것을 막아야 한다
5. 미리 붙여져 있던 패취가 떨어져 나가게 된 경우에는 다른 패취를 붙인 쪽의 반대편 귀 뒤에 붙여야 한다.
6. 3일 이상 적용해야 할 경우 첫번째 것은 제거하고 다른 패취를 붙인 쪽의 반대편 귀 뒤에 붙여야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것.
1) 이 약에 과민증 환자
2) 연고기제에 과민증 환자
3) 협우각형 녹내장 환자
4) 서맥 환자
5) 전립선비대 등 배뇨장애 환자
6) 임부, 수유부

- 7) 7세 이하의 영·유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 노인, 대사질환 환자, 간질환 환자, 신질환 환자(중추신경계 작용이 증강될 수 있다.)
2) 유문폐색, 방광폐색 환자
3. 부작용
1) 구강 : 때때로 구갈이 나타날 수 있다.
2) 눈 : 매우 드물게 급성 협우각형 녹내장의 증상(산동을 수반하는 눈의 통증 및 홍조)이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다. 또한 때때로 일시적인 시력불선명, 산동 등의 시각장애, 드물게 눈의 건조감, 가려움, 홍조가 나타날 수 있다.
3) 심장 : 빈맥이 나타날 수 있다.
4) 호흡기계 : 기관지분비물의 점도가 증가할 수 있다.
5) 비뇨기계 : 드물게 배뇨장애가 나타날 수 있다.
6) 피부 : 드물게 발진, 홍반이 나타날 수 있다.
7) 기타 : 때때로 졸음, 드물게 방향감각상실, 기억력손상, 어지러움, 불안, 환각, 착란 등이 나타날 수 있다.
8) 금단증상 : 이 약의 투여를 중지한 후 어지러움, 구역, 구토, 두통, 평형감각장애 등이 몇 몇 환자(특히, 이 약을 3일 이상 투여한 환자)에서 나타났다.

4. 일반적 주의

- 1) 장폐색의 의심이 있는 환자에게 진토제 또는 항무스카린약물을 투여할 경우에는 주의한다.
- 2) 이 약을 사용중인 환자는 졸음, 방향감각상실, 착란 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기동작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 상용량에서도 특이체질에 의한 반응이 일어날 수 있으므로 주의한다.
- 4) 이 약이 눈에 접촉되어 일시적인 시력불선명, 산동 등의 시각장애가 나타날 수 있으므로 이 제제를 만진 후에는 즉시 비누로 손을 깨끗이 씻어야 한다.
- 5) 소아에게 투여할 경우 반드시 어른이 붙여주어야 한다.
- 6) 처리·이 제제를 사용후 버릴 때 부착면을 반으로 접어 소아의 손이 닿지 않는 곳에 버린다.

5. 상호작용

- 1) 알코올과 같은 중추신경계 작용을 가지는 약물, 특히 항콜린약물(벨라돈나 알카로이드제제), 항히스타민제, 항우울약 등을 투여하는 경우에는 이 약의 작용을 증강시키므로 신중히 투여한다.
- 2) H₁-수용체 저해제의 위산분비억제 효과를 증가시킨다.

6. 과량투여시의 처치

과량투여에 의해 방향감각상실, 기억력 손상, 어지러움, 불안, 환각, 착란 등이 일어나면 즉시 패취를 제거하고 증상이 심한 경우에는 부교감신경흥분제를 투여한다.

【저장방법】

실온(1-30℃)보관, 기밀용기

【포장단위】

2매/박스

* 사용하기에 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인 하실 수 있습니다.

* 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원
명료제약주식회사
경기도 화성시 향남읍 산신리 901-1
www.mmp pharm.co.kr

<설명서작성년월> 88. 6. >
<설명서개정년월> 07. 3. >
<M16>