골관절염 원인치료제 〈전문의약품〉

명문 아트로다® 25밀리그람 캅셀

(디아세레인)

Brand of Diacerhein 분류번호 : 399

명문 아트로다 캅셀은 디아세레인을 주성분으로 하는 골관절염의 근본치료제로서, 80년대 천연 알로에로부터 추출·정제, 개발된 이후 프랑스를 비롯한 유럽의 실제임상에서 그 치료효과가 인정받아 골관절염의 주 치료약으로 자리잡고 있습니다.
명문 아트로다 캅셀은 골관절염 부위의 손상된 연골의 파괴를 억제하고, 연골의 재생을 촉진시켜 골관절염의 증상을 개선·치료합니다.

【원료약품 및 그 분량】
1캅셀 중
디아세레인(식품의약품안전청고시 제98-127호) ····· 25밀리그람

【성 상】
황갈색의 내용물이 들어있는 상부-주황색, 하부-흰색의 경질 캅셀제

【약리작용】
1. 아트로다캅셀은 연골조직의 파괴를 일으키는 Interleukin-1과 TNF-α등의 Cytokine의 생성과 방출을 억제시켜서 골관절염 부위의 연골조직이 손상되는 것을 막아줍니다.
2. 아트로다캅셀은 연골조직의 구성성분인 Collagen과 Glycosaminoglycan 합성을 자극시켜서 손상된 연골조직의 재생을 촉진시킵니다.
3. 아트로다캅셀은 투여 중지후에도 일정기간 지속적인 치료효과를 나타내는 특이한 Carry over effect를 가지고 있습니다.
4. 아트로다캅셀은 위장장애 등의 부작용이 거의 없어 장기간 안전하게 사용할 수 있습니다.
5. 아트로다캅셀은 프로스타글란딘 합성을 억제하여 소염, 진통효과를 내는 단순한 NSAIDs와는 전혀 다른 골관절염의 원인치료제입니다.

【효능·효과】
골관절염(관절증·퇴행성 관절질환)의 치료

【용법·용량】
증세에 따라 2캅셀 또는 4캅셀(디아세레인으로서 50밀리그람 또는 100밀리그람)을 1일 1~2회 분할하여 식후 투여합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이약에 과민한 환자
2. 다음의 경우에는 신중히 투여하십시오.
   이약은 안트라퀴논류이므로 소장, 결장 장애 병력이 있는 환자에게는 투여하지 말거나 혹은 신중히 투여해야 합니다.
3. 부작용
   약한 완하작용이 나타날 수 있습니다.(특히 안트라퀴논 유도체에 민감한 환자)
4. 일반적 주의
   - 동물실험에서 최기형성 작용은 관찰되지 않았으나 임신·수유기에는 투여하지 않는 것이 좋습니다.
   - 장기 연용할 경우 의사의 지시에 따르십시오.
   - 노인에게 투여시 주의해서 투여하며 용량 감소가 가능합니다.
   - 소아에게는 충분한 연구가 없었으므로 투여하지 마십시오.
5. 적용상의 주의
   - 과용량 투여시 약한 완하작용이 나타날 수 있습니다.
   - 약물 복용중 뇨가 노랗게 변색될 수 있습니다.
   - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

[저장방법]
기밀용기, 실온보관

[포장단위]
6, 30, 60, 100, 120, 500캅셀

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원
명문제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 901-1
www.mmpharm.co.kr

〈설명서작성년월:82. 10.〉
〈설명서개정년월:01. 4.〉
〈M13〉

원료공급 및 기술제휴
Manufactured under license of
TRB Chemedica
Geneva, Switzerland