

맨 포 틴 정 (말레인산 트리메부틴)

맨포틴은 소화관 운동의 내성 조절인자인 위장관 내의 내부 신경계(Auerbach 와 Aeissner 신경총)에 주로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 위장관 운동을 회복시켜 주는 양면적 효과를 지닌 위·장기능 조절제입니다.
맨포틴은 위·장관 내부 신경계에 선택적으로 작용하므로써 부교감 신경차단막(항choline제)들이 갖는 구갈, 산통, 발한 등의 전신적 부작용을 유발하지 않으므로 내약성이 높아 장기치료와 유·소아 및 노령자 치료시에 요구되는 안전성을 충분히 확보하고 있습니다. 또, 소화 불량이나 과민성 대장염 등 기능적 소화관 질환에도 좋은 약입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중
말레인산 트리메부틴(KPC) 100mg

【성 상】 백색의 원형정제

【약리작용 및 특징】

1. 위·장관 운동의 양면 조절작용
소화관 내부의 신경계(Meissner's, Auerbach 신경총)에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 억제된 기능을 조절하는 양면 작용으로 기능적 소화불량 및 과민성 대장증후군에 효과가 있습니다. 반면 종래의 소화기 치료에는 자율신경과 소화관 외부의 신경에 작용하여 소화관 운동을 억제 또는 촉진시키는 일면성만 있었습니다.
2. 선택적인 장운동 및 연동운동 촉진작용
맨포틴은 소화관의 비정상적인 운동에만 관여하여 위·십이지장 궤양 또는 각종 소화기 질환에 나타나는 식전의 이상운동을 억제함으로 이런 환자의 통증에 효과적이며 정상적인 운동에는 영향을 미치지 않습니다. 그리고 기능적 소화불량 환자에게서 위 기능저하로 지연되는 위 연동운동을 촉진시켜 신속한 소화작용을 유도합니다.
3. 유·소아의 위장관 기능 조절작용
맨포틴은 유·소아의 습관적인 구토, 설사, 변비에 대하여 위장관 기능 조절작용에 의한 치료 효과를 나타냅니다. 또 중뇌 수준까지만 작용하는 작용에 의해 유·소아의 동요자극, 수면장애를 개선합니다.
4. 신경작용
신경작용이 Papaverine의 10배나 강력하므로 장관경련 해소 등 통증을 제거시켜 줍니다.

【효능·효과】

1. 주효능 효과
 - 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장 궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
 - 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
 - 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

【용법·용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용
 - 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
 - 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.

4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다

5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에게는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지하십시오.

【포장단위】 1,000정

【저장방법】 기밀용기

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의 깊게 읽으시고 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.kmspharm.com>)에서 확인할 수 있습니다.

작성년월 : 2006.02



개량신약기술로 앞서가는기업

케이엠에스제약(주)

경기도 수원시 영통구 매탄3동 492-1

TEL(031)215-5456 FAX(031)215-5925

www.kmspharm.com