

후메칠정

염산 부플로메딜

KGMP지정업소

전문의약품
분류번호 : 217

후메칠정은 프랑스의 Laboratoire L. Lafon 연구진에 의해 최초로 개발된 말초혈류개선제로 프랑스를 비롯한 미국, 독일, 이태리등 구미 각국에서 발매되어 치료효과를 인정받은 약제입니다.

후메칠정은 미소혈관에 직접 작용하여 미소혈관을 확장시키며 모세혈관의 경축을 억제하여 산소와 영양의 공급을 원활하게 하는 말초혈류개선제로서 말초혈류장애로 인한 손발이 차고 저린 증상, 하지경련등의 제 증상을 치료하는데 효과를 나타냅니다.


【성분·함량】

1정 중

염산부플로메딜 (식약청고시 제98-127호) 150mg

【성 상·성분조성】

백색의 원형 당의정



분자식(M.W) : $C_{17}H_{25}NO_4 \cdot HCl$ (343.85)

【작 용】

1. 약리작용

- ① 혈관벽에 대해 직접적인 확장 작용을 나타냅니다.
- ② 심근의 α -adrenoreceptor에 길항작용이 있습니다.
- ③ 혈소판 응집을 저해하여 혈액의 점도를 감소시키므로 혈류량 증가 작용을 나타냅니다.
- ④ Ca^{2+} 길항 작용이 있으므로 혈관 확장의 효과가 있습니다.
- ⑤ 산소 소비를 감소시켜 허혈성 조직에 대한 영양 공급 향상 효과가 있습니다.

2. 체내 약물 동태

위장관에서 흡수되어 50~80%의 생물학적 이용율을 나타내며 2.97시간의 반감기를 가지고 주로 요중으로 배설되는데 평균 요중 회수율은 미변화체가 18%, 대사물(p-desmethy buflomedil)이 14.8%를 차지합니다.

【효능·효과】

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애 : 레이노병 및 레이노증후군, 간헐성 파행, 폐색성 혈전혈 관염(버거병), 홍청색증, 맥관저의 경련
2. 뇌순환부전 : 어지러움, 이명, 치매성 증상, 성격변화, 기억력·집중력 저하, 시간과 공간에 대한 지남력 상실, 뇌졸중 후유증

【용법·용량】

성인 : 염산부플로메딜로서 1일 300~600mg을 분할 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 임신 초기 3개월, 분만직후 임부, 수유부
 - 2) 중증의 동맥출혈 직후 환자.
 - 3) 이 약에 과민증 환자
 - 4) 소아
 - 5) 심근경색 환자
 - 6) 저혈압 환자
 - 7) 심부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
신부전 환자
3. 부작용
드물게 소화장애, 혈압저하, 기립성 조절장애, 두통, 구역, 구토, 어지러움, 피부발열감, 홍조, 가려움, 말단부를 찌르는 듯한 느낌, 설사, 유부압박감 등이 나타날 수 있으나, 투여를 중지하면 사라진다.
4. 상호작용
혈관확장제, 칼슘길항제, 혈압강화제 및 알코올과 병용투여하는 경우에는 혈압강화작용이 증강 될 수 있다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생이 보고되었으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는다.
 - 2) 모유중으로의 이행이 알려진 바 없으므로 수유중에는 투여하지 않는다.
6. 과량투여시의 처치
과량투여의 경우 초조, 흥분, 심박동수증가 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 벤조디아제핀계 약물을 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 3년

【포장단위】

30, 200정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎ 02-6207-6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 이 의약품 첨부서재 정년월일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에 명시되어 있으며, 또한 본사로 문의하실 수 있습니다.

작성년월일 : 1986. 08. 12

개정년월일 : 2008. 04. 04

PR0960804

유명제약

제조업소명 : 유명제약
충청북도 공주시 공덕로 482-17