KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 114

비Steroid성 소염 · 진통제

# 카루돌 캅셀

# Carudol Cap.

(피라지노부타존)

**카루돌캅셀**은 프랑스 Lab. Francaij de Therapeutique社에서 개발한 Pyrazinobutazone제제의 비Steroid성 소염 · 진통제입니다.
**카루돌캅셀**은 염증과 발열의 병인에 기인하는 Prostaglandin, Bradykinin의 생합성 및 기능을 억제하여 신속하고 지속적인 소염 · 진통 효과를 나타냅니다.

**[원료약품 및 그 분량]**
1캅셀 중
피라지노부타존 (식약청고시 제98-127호) ····· 300mg

**[성 상]**
백색 - 엷은 황색 분말이 들어있는 상부 하늘색, 하부 미색의 캅셀제

**[작 용]**
1. 약효 · 약리
   ① Prostaglandin의 생합성 및 수용체 차단의 이중 작용에 의해 진통 · 소염작용을 나타냅니다.
   ② 요산 배설 촉진 작용으로 급성 통풍 질환에도 유효합니다.
   ③ Phenylbutazone과 효과면에서는 동등하나 부작용이 적습니다.
2. 체내 약물 동태
   복용 4시간 후에 최고 혈중 농도에 도달하고 대부분 혈장 단백과 결합하여 24시간의 약효 지속 시간과 48~72시간의 반감기를 가지고 대부분이 대사되어 뇨중으로 배설됩니다.
3. 독성(pH7의 현탁액 경구투여시)
   $LD_{50}$(mg/kg) mouse : 3250
   rat : 550

**[효능 · 효과]**
다음 질환에 사용할 수 있다. :
류마티스양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 급성통풍

**[용법 · 용량]**
성 인 : 1회 1캅셀씩 1일 2~3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

**[사용상의 주의사항]**
1. 경 고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 소화성 궤양환자
   2) 신장애 환자
   3) 간장애 환자
   4) 혈액장애 환자
   5) 심기능부전 환자
   6) 이 약 및 피라졸론 유도체에 과민증 환자
   7) 14세 이하의 어린이

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 소화성 궤양의 병력이 있는 환자
   2) 신장애의 병력이 있는 환자
   3) 간장애의 병력이 있는 환자
   4) 혈액장애의 병력이 있는 환자
   5) 과민증의 병력이 있는 환자
   6) 고혈압 환자
   7) 고령자
4. 부작용
   1) 소화기 : 때때로 구역, 구토, 위통, 설사가 나타날 수 있다. 또한 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 소화성 궤양, 위장출혈 및 천공이 나타날 수 있다.
   2) 과민증 : 두드러기, 홍반, 박탈성 피부염, 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성표피괴사증) 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
   3) 혈 액 : 드물게 재생불량성 빈혈, 과립구 감소, 백혈구 감소, 혈소판 감소가 일어날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
   4) 순환기 : 고혈압, 수종의 저류가 나타날 수 있다.
   5) 간 장 : 매우 드물게 간염, 트랜스아미나제의 상승이 일어날 수 있다.
   6) 기 타 : 때때로 부종, 드물게 시각장애가 일어날 수 있다.
5. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
   2) 만성 질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      ① 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능건사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
      ② 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      ① 급성 염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
      ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
6. 상호작용
   1) 설폰아미드계 혈당강하제, 페니토인, 경구용 항응혈제, 아스피린 및 다른 비스테로이성 소염진통제와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
   2) 비스테로이드성 소염진통제는 혈장 리튬치를 증가시키고 청소율을 감소시키므로 리튬제제와 병용투여시 리튬의 독성에 주의한다.
   3) 메토트렉세이트와 병용투여시 그 혈액학적 독성을 증가시키므로 병용투여하지 않는다.
7. 임부에 대한 투여
   임신 초기 및 말기 3개월간은 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.

**[저장방법 및 사용기간]**
기밀용기, 3년

**[포장단위]**
100, 200, 500, 1000캅셀

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎927~8184) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

작성년월일 : 1987. 3. 25
개정년월일 : 2003. 3. 11

**PR0490303**

제조발매원
(株) 柳英製藥
공장 : 충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17