KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 119

골격근 이완제

스락신 정 10mg

Slaxin Tab. 10mg

(염산올페나드린)

스락신정은 염산 올페나드린 성분의 골격근 경련 · 이완제로서 근의 이상긴장을 완해하며 동시에 2차적인 동통을 제거합니다.

【원료약품 및 그 분량】
1정 중
염산올페나드린 (B.P.) ····· 10mg

【성　　상】
백색의 원판형 정제

【효능 · 효과】
1. 특발성 파킨슨증
2. 기타의 파킨슨증(뇌염후, 동맥경화성)
3. 골격근 연축의 진통

【용법 · 용량】
성　인 : 염산올페나드린으로서 1회 50mg(5정) 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 녹내장 환자
   2) 유문 및 십이지장 폐색 환자
   3) 협착성 소화성 궤양 환자
   4) 전립선 비대 및 방광경부폐쇄 환자
   5) 분문연축(거대식도) 환자
   6) 중증의 근무력증 환자
   7) 이 약에 과민증 환자
   8) 지발성 운동장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 빈맥 환자
   2) 심혈관질환 환자
   3) 간 · 신장애 환자
3. 부작용
   구갈, 심계항진, 변비, 배뇨장애, 시야몽롱, 산통, 졸음, 안긴장, 구역, 구토 등의 위장관장애, 허약, 두통, 빈맥, 어지러움, 두드러기, 피부질환, 매우 드물게 다행증, 불면, 신경질 등이 나타날 수 있으나 용량을 감소하거나 투여를 중지하면 사라진다.
4. 일반적 주의
   일반 환자에서 약물의존성이 나타날 수 있으므로 이 약의 투여를 갑자기 중단하지 않는다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
   임신중 및 수유중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
6. 소아에 대한 투여
   유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

【저장방법 및 사용기간】
차광밀폐용기, 실온보관, 3년

【포장단위】
1000정

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎ 02-6207-6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 이 의약품 첨부문서 개정년월일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.yypharm. co.kr)에 명시되어 있으며, 또한 본사로 문의하실 수 있습니다.

작성년월일 : 1999. 7. 7
개정년월일 : 2002. 3. 13

PR0840203

제조발매원
(株) 柳英製藥
충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17