KGMP지정업소

전 문 의 약 품
분류번호 : 399

골관절염 치료제

루마테린 캅셀

Rumaterin Cap.

(디 아 세 레 인)

루마테린캅셀은 관절연골의 구성물질인 Proteoglycan 파괴를 저해하여 관절연골을 보호하고 연골조직의 신진대사를 촉진시켜 골관절염을 원인적으로 치료하는 약물입니다.
루마테린캅셀은 기존의 NSAID제제와 화학구조가 전혀 다른 Anthraquinone 유도체로서 NSAID 제제에서 부작용으로 나타나는 위장장애를 극소화시킨 골관절염 치료제입니다.

【원료약품 및 그 분량】
1캅셀 중
디아세레인 (식약청고시 제98-127호) ·····50mg

【성　　상】
황갈색의 내용물이 충전된 상부 백색, 하부 황색의 경질캅셀

【효능 · 효과】
골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)의 치료

【용법 · 용량】
증세에 따라 1캅셀 또는 2캅셀(디아세레인으로서 50mg 또는 100mg)을 1일 1~2회 분할하여 식후 투여한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   이 약에 과민한 환자
2. 다음의 경우에는 신중히 투여할 것
   이 약은 안트라퀴논류이므로 소장, 결장 장애 병력이 있는 환자에게는 투여하지 말거나 혹은 신중히 투여해야 한다.
3. 부작용
   약한 완하작용이 나타날 수 있다.(특히 안트라퀴논 유도체에 민감한 환자)
4. 일반적 주의
   1) 동물실험에서 최기형성 작용은 관찰되지 않았으나 임신 · 수유기에는 투여하지 않는 것이 좋다.
   2) 장기 연용할 경우 의사의 지시에 따른다.
   3) 노인에게 투여시 주의해서 투여하며 용량 감소가 가능하다.
   4) 소아에게는 충분한 연구가 없었으므로 투여하지 않는다.
5. 적용상의 주의
   1) 과용량 투여시 약한 완하작용이 나타날 수 있다.
   2) 약물 복용중 뇨가 노랗게 변색될 수 있다.
   3) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】
기밀용기, 3년

【포장단위】
100, 500캅셀

※ 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 등 의약품 판매업소에 한하여 본사(☎ 02-6207-6114) 또는 영업소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 이 의약품 첨부문서 개정년월일 이후에 변경된 내용에 관해서는 자사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에 명시되어 있으며, 또한 본사로 문의하실 수 있습니다.

작성년월일 : 1995. 2. 21
개정년월일 : 2003. 11. 11

PR0060311

제조발매원
(株) 柳英製藥
충북 진천군 광혜원면 죽현리 492-17