일반의약품

비뇨생식기관용제	
분류번호	255

광범위 질염치료제

세나서트® 2mg 질정

산부인과 영역에서의 각종 질병의 치료 및 예방은 설파제와 페니실린을 비롯한 각종 항생물질의 등장에 따라 비약적으로 개선되었으나, 소위 "대하"로 고심하는 여성수는 아직도 대단히 많은 반면 그 치료법은 별로 발전되지 않아서 환자 자신이 심한 불쾌감을 겪고 있는 현실입니다. 대하란 주로 여성질내에 미생물이 감염되어 일어나는 증상의 속칭으로 그 대표적인 질환은 트리코모나스질환과 질칸디다증입니다. 트리코모나스질환은 질트리코모나스(원충)의 감염에 의한 질염으로서 다량의 황색포말상 대하가 있고 질내가 헐며(미란) 때로 국소의 소양감을 동반하는 불쾌한 증상을 나타냅니다. 질칸디다증은 칸디다(진균)의 감염에 의한 질환으로서 농후한 우유빛의 대하가 있고 잠을 잘 수 없을 만큼 외음부 소양증을 동반하는 것이 특징입니다.

지금까지 대하치료에 쓰고 있는 약제의 수는 결코 적지 않았으나 그 어느것도 효과의 불확실성과 부작용의 발생으로 만족할 만한 성적을 얻을 수 없었습니다. 테트라싸이클린계 항생물질은 트리코모나스질환에는 효과가 있으나 질칸디다증에는 효과가 없고 균교대증으로 질칸디다증을 야기시키며 나아가서는 질의 자정작용에 중요한 역할을 하는 데더라인씨 질간균을 구축하기까지 합니다. 따라서 대하의 치료제로서 양질환 즉 트리코모나스질환과 질칸디다증에 유효하며 데더라인씨 질간균에는 영향을 주지 않는 동시에 부작용이 없는 약제가 요망됩니다. **세나서트 2MG** 질정은 미국 Central Pharmaceutical Inc.에서 연구 개발된 약산성약물로서 트리코모나스성, 칸디다성, 세균성질염 즉 Three Germicidal Agents로 양호한 처방의 약제입니다.

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

9-아미노아크리딘 운데시레네이트 (별규) ····· 2.0mg
염산 N-미리스틸-3-하이드록시 부틸아민(별규) ····· 2.0mg
메칠벤제토니움 크로라이드(U.S.P.) ····· 3.6mg

■ **성상**

연황색 타원형 정제

■ **약리작용 및 특징**

1. 살균작용이나 살진균작용이 강하며 특히 혐기성균에 효과적이며, 백혈구의 식균작용에 영향을 미치지 않고 유기물이나 농(pus)의 존재하에서도 활성도가 변하지 않습니다.
2. 피부에 존재하는 유기물(세균)을 99% 살균 제거합니다.
3. 피부표면에 활성적이며 질벽주름에 유효성분의 침투가 용이합니다.
4. 트리코모나스, 칸디다, 세균에 의한 질염치료시 삼중 살균작용을 합니다.
5. 질의 pH를 약산성으로 조정하여 주성분이 활성화되고 세균감염이 방지되도록 처방되었습니다.
6. 사용시 자극성이 없으며 장기사용해도 내약성이 좋습니다.
7. 생리중이나 임신중에도 계속 사용할 수 있습니다.

■ **효능 · 효과**

질트리코모나스증, 질칸디다증, 비특이성 세균성질염, 혼합감염증

■ **용법 · 용량**

성인 : 1회 1정, 1일 1회 질내 깊숙이 삽입하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
   이 약에 과민증 환자
2. 일반적 주의
   이 약 투여시 자극감이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
3. 상호작용
   이 약은 콘돔, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의하십시오.
4. 적용상의 주의
   이 약은 질내에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 마십시오.

■ **저장방법** : 밀폐용기, 건냉암소

■ **포장단위** : 자사 포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 설명서 작성년월일 : 1996. 04. 01
※ 설명서 개정년월일 : 2001. 01. 29

(주)에이치팜
경기도 화성시 향남면 상신리 902-3
http://www.hanwha-pharm.com
문의전화 : 080-729-5800

01FM0070D