일반의약품

진해거담제	
분류번호	222

객담용해제

아티란 캡슐 200mg

(Acetylcysteine)

아티란 캡슐의 주성분인 아세틸시스테인은 객담의 성분인 뮤코단백의 구조를 분해하여 객담의 점도를 저하시키는 시스테인계 약물로서, 객담의 유동성 및 용해도를 증가시켜 급만성기관지염, 기관지천식 등 객담이 수반되는 호흡기 질환에 유용합니다.

■ **원료약품의 분량 :** 1캡슐 중

아세틸시스테인 (U.S.P.) ····· 200mg

■ **성상** : 백색 분말이 든 상부 녹색, 하부 백색의 캡슐제

■ **약리작용 및 특징**

1. 아세틸시스테인의 –SH기가 점액의 –S–S–결합을 분해하여 객담의 점도를 효과적으로 저하시킵니다.
2. 객담의 유동성을 증가시키고 점착성을 저하시켜 객담배출을 용이하게 합니다.

■ **효능 · 효과**

1. 주 효능 · 효과
   1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 :
      급 · 만성 기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
   2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

■ **용법 · 용량**

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여하십시오.

· 급성 질환
  – 성인 : 1회 200 mg, 1일 3회
  – 소아 : 6–14세 1회 200mg, 1일 2회
· 만성 질환
  – 성인 : 1회 200mg, 1일 2회
  – 소아 : 6–14세 1회 100mg, 1일 3회
· 낭성섬유종
  – 소아 : 6세 이상 1회 200mg, 1일 3회
  – 2~5세 1회 100mg, 1일 4회

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 위 · 십이지장궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오
   신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 마십시오.)
3. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴 쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식환자) 등이 나타날 수 있습니다.
   3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있습니다.
4. 상호 작용
   경구용 항생물질 (아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오.)
5. 임부에 대한 투여
   임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여하십시오.
6. 수유부에 대한 투여
   이 약이 모유로 분비되는지는 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.
7. 적용상의 주의
   이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피하여 주십시오.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사 포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 http://www.hanwha-pharm.com나 수신자부담문의전화 080-729-5800 에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 작성년월일 : 1998. 01. 20.
※ 설명서 개정년월일 : 2004. 07. 01.

(주)에이치팜
경기도 화성시 향남면 상신리 902-3
http://www.hanwha-pharm.com
080-729-5800(수신자부담문의전화)

FM22054