

알레르기 치료제

테리진정

(염산세티리진)

알레르기 질환은 사람의 코 점막, 기관지 점막, 위 장관 및 피부가 주위환경에서 접하는 여러 원 인물질에 노출되어 각 장기마다 특이한 반응을 나타내는 것으로 우리나라의 경우 성인 10여명 중 1 명 정도가 이 질환을 앓고 있다고 합니다. 특히 생활 환경의 변화, 공해, 스트레스 등의 급증으로 각 중 알레르기 질환 환자가 계속 증가하고 있습니다.

테리진 정은 이런 여러가지 Allergen에 의해 생기는 각종 알레르기 질환(각종 비염, 두드러기, 결 막염, 가려움증, 호흡기 질환 등)을 신속하고 효과적으로 치료하는 알레르기 질환 치료제로서, 특히 기존의 항히스타민제보다 이상반응이 적기 때문에 간이나 심장에 영향을 미치지 않는 선택성이 뛰 어난 제제입니다.

❶ 성분·함량 : 1정 중

염산 세티리진(B.P).....10mg

❷ 성 상 : 흰색의 타원형 필름코팅정

❸ 약리작용 및 특징

- 테리진 정은 항히스타민 작용이 강력합니다.
알레르기의 작용은 항원 침투후 30분~1시간 이내에 나타나는 Early reaction 및 7~8시간 후에 나타나는 Late reaction으로 이루어지는데, 테리진정은 이 두 반응에 모두 작용하여 강 력한 항히스타민 효과를 나타낼 뿐만 아니라, 항염증 효과도 우수합니다.
- 테리진 정은 선택성이 뛰어나 중추작용, 진정작용등의 이상반응이 없습니다.
Cetirizine은 BBB(Blood Brain Barrier, 뇌혈액관문)를 통과하지 않으므로 중추에 영향을 미치지 않고, 따라서 기존의 1세대 항히스타민 제제와는 다르게 졸리움등의 진정작용을 나타 내지 않습니다.
- 테리진 정은 1일 1회 투여로 약효가 지속됩니다.
테리진 정은 알레르기의 두 단계 반응인 Immediate allergic reaction 및 Late-phase allergic reaction에 모두 작용하므로 1일 1회 투여로 24시간 동안 우수한 치료효과를 나타 내는 효과적이고 편리한 치료제입니다.
- 테리진 정은 약효작용 발현시간이 신속한 속효성 알레르기 치료제입니다.
테리진 정은 간대사과정을 거치지 않고 체내에 신속히 흡수되어 투여후 약 1시간 정도면 최고 혈중농도에 도달하므로, 작용발현이 매우 빨라 각종 알레르기 증상을 신속하게 제거해 줍니다.

❹ 효능·효과

- 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부 소양증
- 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염

❺ 용법·용량

성인 및 6세 이상의 소아 : 염산세티리진으로서 1일 1회 10mg 취침전에 경구 투여하십시오.
이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 분할 투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

❻ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 신부전 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 6세 미만의 유아
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 신장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
 - 간장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
 - 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다.)
- 이상반응
 - 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어 지러움, 두중, 흥분이 나타날 수 있습니다.
 - 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상 나타날 수 있습니다.
 - 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - 혈 액 계 : 맥관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 림프구증가, 호산구증가, 드물게 단구 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 하십시오.
 - 과 민 증 : 광과민증, 아나필락시 속, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타 날 수 있습니다.
 - 눈 : 드물게 흐린시력, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
 - 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ -GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상 : 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있습니다.

9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불 순, 이명이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

건강한 지원자에게 1일 20-25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 이상반응도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않습니다.

5. 상호작용

다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여 하지 않습니다.

2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단합니다.

7. 소아에 대한 투여

6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경 우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 합니다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시의 증상은 진정입니다. 이 경우 위세척을 실시합니다.

10. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르기항원 피내반응을 억제하므로 알레르기항원 피내반응검사를 실시하기 3-5일 전에는 이약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

11. 기타

증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따 라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다.

❶ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 하여 드립니다.

* 본 제품은 재정경제부 고시에 의거 소비자 피해를 보상해 드립니다.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 080)780-1931에서 확 인할 수 있습니다.>

최종작성일자 : 2007. 10. 19



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지
문의전화 : (080)780-1931