500T

알마겐트정

Almagate 500mg

【원료약품 및 분량】 1정 (532.85mg) 중
알마게이트 (식품의약품안전청고시) ····· 500mg

【성 상】 흰색의 장방형 정제

【효능 · 효과】

1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성 식도염.

【용법 · 용량】

1. 성인 : 알마게이트로서 1회 1g, 1일 4회 식후 1~2시간 및 취침시에 경구투여한다.
   (정제는 씹어서 복용하고, 1회 2정 복용한다.)
2. 소아(6~12세) : 성인 용량의 1/2을 투여한다.
3. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   다른 약물을 투여받고 있는 사람.
2. 부작용
   소화기계 : 이 약을 투여받는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
   2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여합니다.
   3) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
4. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여를 하지 않습니다.
   2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH상승에 의해 병용약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여합니다.
5. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처 및 본사에서 교환해 드립니다.

개정년월일 : 07. 4. 20

HDPE
분리배출

8 806102 313824

제조판매원
(株)韓國코러스製藥
KGMP 적격업체
서울특별시 영등포구 당산동 6가 121-150
공 장 : 충북 제천시 강제동 253-12
www.koruspharm.co.kr

제조번호 :

사용기한 :