레비신 정

(레보플록사신)

전문의약품

Levicin Tab.

분류번호:629

■원료약품의 분량 : 1정 중

레보플록사신(별규) ····· 100㎎

■성 상

백색~미황색의 원형필름코팅정제입니다.

■효능·효과

포도구균속, 화농연쇄구균, 용혈연쇄구균, 장구균속, 폐렴구균, 펩토스트렙토코카스속, 임균, 대장균, 시트로박테르속, 시겔라속, 엔테로박테르속, 새라치아속, 프로테우스속, 녹농균, 인플루엔자균, 아시네토박테르속, 캄피로박테르속, 클라미디아 트라코마티스 중 본제 감수성균에 의한 하기감염증

1) 절, 절종증, 옹, 단독, 봉소염, 한선염, 임피관(절)염, 피하농양, 집족성좌창, 감염성분류, 모낭염, 표저
2) 유선염, 외산, 열상, 수술창 등의(표재성) 이차감염, 항문주위농양
3) 인후두염, 급성기관지염, 만성기관지염, 미만성 범세기관지염, 만성호흡기 질환의 2차 감염, 폐렴, 기관지확장증(감염시), 편도염
4) 신수신염, 방광염, 저림선염, 임균성요도염, 비임균성요도염, 부고환염
5) 담낭염, 담관염
6) 세균성적리, 장염
7) 자궁부속기염, 자궁내감염, 바르톨린선염
8) 안검염, 맥립종, 누낭염, 검판선염, 각막궤양
9) 중이염, 부비강염
10) 치주조직염, 악염

■용법·용량

보통 성인에 대하여 레보플록사신으로서 1회 100밀리그람을 1일 2~3회 경구투여 합니다. 감염증의 종류 및 증상에 의해 적의 증감하거나, 중증 또는 효과가 불충분하다고 생각되는 경우에는 레보플록사신으로서 1회 200밀리그람을 1일 3회 경구투여합니다.

■사용상의 주의사항

1. 경고
   외과수술이 필요하거나 무능력 연장을 일으키는 어깨, 선, 아킬레스건파열이 보고되었습니다. 환자가 통증, 염증, 건파열을 느끼는 경우에는 투여를 중지합니다. 건염 또는 건파열이 아님이 확실히 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가합니다. 건파열은 이 약 투여 중 또는 후 등 언제든지 나타날 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오
   1) 이 약의 성분 및 오플록사신에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 퀴놀론계 항생물질과 관련된 과민증 건염, 건파열의 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
   1) 중증 신장애 환자
   2) 간질 등의 경련성 질환 또는 그 병력이 있는 환자(경련을 일으킬 우려가 있는 환자)
   3) 퀴놀론계 항균제에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
   4) 고령자
4. 부작용
   1) 쇽 : 드물게 쇽 증상이 나타난다는 보고가 있으므로 관찰을 충분히 행하고, 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
   2) 과민증 : 때때로 발진, 가려움, 드물게 아나필락시양 증상(홍반, 오한, 호흡곤란), 광선과민증 부종, 두드러기, 열감 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오.
   3) 정신신경계 : 때때로 불면, 어지러움, 두통 등이 나타날 수 있습니다. 또 오플록사신에서 드물게 경련, 진전, 저린감이 나타난다는 보고가 있습니다.
   4) 신장 : 때때로 BUN의 상승이 나타날 수 있습니다. 또 오플록사신에서 드물게 급성신부전이 나타난다는 보고가 있습니다.
   5) 간장 : 때때로 AST, ALT, γ-GTP, 총 빌리루빈의 상승, 간기능장애, 황달, 중증간염이 나타날 수 있습니다.
   6) 혈액계 : 때때로 백혈구감소, 적혈구감소, 헤모글로빈감소, 헤마토크릿트치감소, 호산구증가, 범혈구감소증, 용혈성 빈혈(증상:헤모글로빈뇨), 혈소판 감소 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 나타난 경우에는 투여를 중지하십시오.
   7) 소화기계 : 때때로 구역, 구토, 복부불쾌감, 설사, 식욕부진, 복통, 복부팽만감 등이 나타날 수 있습니다. 또 드물게 오플록사신에서 위막성 대장염 등의 혈변을 동반한 심각한 대장염이 나타날 수 있으므로 복통, 빈번한 설사가 나타날 경우에는 바로 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오.
   8) 근육 : 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 한 급격한 신기능 악화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
   9) 피부 : 피부점막안 증후군(스티븐슨-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(리엘증후군)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

10) 호흡기계 : 발열, 해소, 호흡곤란, 흉부X선이상, 호산구증가 등을 동반하는 간질성 폐렴이 나타나는 경우가 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 하십시오.

11) 기 타

① 다른 뉴퀴놀론계 항균제에서 드물게 저혈당이 나타나는(고령자, 특히 신장애 환자에게 나타나기 쉽습니다.) 수가 있으므로 신중히 투여 하십시오.

② 발작, 수면장애가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

1) 소인이 있는 환자에는 발작 또는 다른 중추신경계 부작용이 나타날 수 있음을 주지시키십시오.

2) 통증, 염증, 건파열이 나타날 경우에는 치료를 중지하고 의사에게 알리고 건염 또는 건파열이 아님이 확실이 진단될 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가하십시오.

6. 상호작용

1) 유사화합물(에녹사신 등)에서 페부펜 등의 페닐초산계 또는 프로피온산계 비스테로이드성 소염진통제와의 병용에 의해 흡수가 저하하고 드물게 경련이 나타난다는 보고가 있으므로 신중히 투여하십시오.

2) 알루미늄 또는 마그네슘 함유 제산제 또는 철분제제와의 병용에 의해 흡수가 저해되고 효과가 감약할 우려가 있으므로 병용은 피하는 것이 바람직 합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않습니다.

2) 오플록사신에서 모유중으로 이행하는 것이 알려져 있으므로, 수유부에의 투여는 피하는 것이 바람직 하지만, 부득이 투여할 경우에는 수유를 중단 하십시오.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않습니다.

9. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장에서 배출되는데 고령자는 신기능이 저하되는 경우가 많기 때문에 높은 혈중농도가 지속될 수 있으므로 1회 100mg, 1일 2회 투여량과 투여 간격에 유의하여 신중히 투여하십시오.

10. 기타

1) 외국에서 다른 뉴퀴놀론계 항균제의 투여에 의하여 드물게 아킬레스건염, 건파열 등의 건장애가 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정될 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

2) 동물실험(어린개, 젊은 성견(13개월), 어린 랫트)에서 관절이상이 나타났다는 보고가 있습니다.

■포 장 단 위

10, 100, 500정

■저 장 방 법

밀폐용기, 실온보관

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

* 본제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술부로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 02-3461-2471/4)

작성년월일 : 2001. 1. 17
개정년월일 : 2001. 5. 17

제조 · 판매원
대한뉴팜(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-3