위장관 기능 조절제

탐부틴 정 100mg

(말레인산트리메부틴)

일반의약품

Tambutine Tab

분류번호:239

■원료약품의 분량 : 1정중

말레인산트리메부틴(식품의약품안전청고시 제98-127호)·····100mg

■성　　상

백색의 원형 정제입니다.

■작용 · 특성

1. **탐부틴**은 과민성 대장 증후군, 과민성 소화관 운동 항진에 대해서는 억제 효과를 기능부전성 소화불량에 대해서는 위장관 운동을 항진시켜 변비 설사나 그 교대 증상에 대해 개선효과를 나타내는 양면적 위장관 기능 조절제입니다.
2. **탐부틴**은 과민성 대장질환, 경련성 결장 등 기능성 결장 질환이나 엑스선(내시경) 검사시의 경련성 유문 및 결장 경련 가스 팽만으로 인한 경련성 동통에 국소마취 및 신경 작용을 합니다.
3. **탐부틴**은 중추나 자율신경에 영향을 주지 않으므로 부작용이 적고, 내약성이 높아서 장기 치료를 할 수 있고, 유 · 소아나 노인 환자에게도 안심하고 사용할 수 있습니다.

■효능 · 효과

1. 주효능 · 효과
   1) 식도 역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장 궤양에 있어서의 소화기능 이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
   2) 과민성 대장 증후군 및 경련성 결장
   3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비 설사), 동요자극, 수면장애

■용법 · 용량

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■사용상의 주의사항

1. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
   3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있습니다.
   4) 간　　장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.
   5) 과 민 증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시에는 수유를 중지하십시오.

■포장단위

탐부틴 정 100mg : 10, 100, 500, 1000정

■저장방법

밀폐용기에 보관하십시오.

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

작성년월일 : 2001. 12. 31

제조 · 판매원

대한뉴팜(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 904-3