

소화제 리벤돌 정

(알리벤돌)

전문 의약품

Libendol Tab.

분류번호 : 239

■ 성분 · 함량 : 1정 중
알리벤돌(식약청고시) 100mg

■ 성 상 : 적색의 장방형 당의정입니다.

■ 약리작용

리벤돌정의 성분인 알리벤돌(alibendol)은 프랑스의 Dr. Bouchara 연구팀이 개발한 담즙생성 및 분비 촉진제로 간담도에만 정확하게 작용하는 이담소화제입니다.

실험결과 알리벤돌은 지속적이고 현저한 최담작용을 나타내었으며 수분량이 많고 점도가 낮은 담즙을 분비하는 hydrocholeretics와는 달리 고농축된 담즙의 분비를 유도합니다. 또한 Oddi's sphincter의 경련을 완화시켜 담즙의 배출을 촉진합니다. 이러한 약리작용으로 리벤돌정은 지방의 소화 · 흡수 및 비타민, 칼슘, 철분 등의 다른 영양소의 흡수를 촉진 시키며 특히 간 및 담도 질환으로 인한 각종 소화장애에도 우수한 임상성적을 나타내었습니다.

■ 특 징

1. 리벤돌 정은 프랑스 Sochibo사로부터 오리지날 원료를 공급받아 생산하고 있습니다.
2. 리벤돌 정은 단순 소화불량 뿐 아니라 간경변, 담석증, 담낭절제후증후군, 담도운동장애, 간염 등 간담도의 기질적인 원인에 의한 소화불량에도 70% 이상의 개선율을 보였습니다.
3. 리벤돌 정은 소아용량이 확립되어 있고(4mg/kg/day), rat 및 rabbit에 체중 kg 당 50, 100, 200mg을 투여한 최기형성 독성시험에서도 모체 및 태자에 아무런 영향을 미치지 않았습니다.
4. 리벤돌 정은 부작용 및 금기사항, 타 약물과의 상호작용 등이 없으므로 보다 안전하게 처방할 수 있습니다.

■ 효능 · 효과 소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료

■ 용법 · 용량

성인 : 알리벤돌로서 1일 300-400mg을 3-4회 분할하여 식전 및 취침시 경구투여 합니다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 일반적 주의
 - 1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
 - 2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
2. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게 경구투여 하지 않습니다.(정제)
3. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 포장단위 리벤돌 정 : 100, 500, 1000정

■ 저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펴한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의 사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 02-3415-7837)

작성년월일 : 1996. 6. 25

개정년월일 : 2002. 5. 15

제조 · 판매원

 **대한뉴팜(주)**

경기도 화성시 향남면 상신리 904-3



원료공급원

SOCHIBO
France

30050996-01