진해 · 거담제

뮤시딘 캡슐 100/200mg

(아세틸시스테인)

일반의약품

Mucidin Cap.

분류번호 : 222

■ **원료약품의 분량** : 1캡슐 중

뮤시딘 캡슐 100mg : 아세틸시스테인(U.S.P)---------- 100mg

뮤시딘 캡슐 200mg : 아세틸시스테인(U.S.P)----------200mg

■ **성 상**

뮤시딘 캡슐 100mg : 백색분말이 든 상 · 하부 초록색 경질 캡슐제입니다.

뮤시딘 캡슐 200mg : 백색분말이 든 상 · 하부 연청색 경질 캡슐제입니다.

■ **작용 · 특성**

1. **뮤시딘**은 과도한 객담 또는 점액성 객담 생성과 관련된 다양한 호흡기 질환에서 기침을 완화시키고 점액 용해 작용을 하여 호흡기 질환을 치료하는 진해 및 거담제 입니다.
2. **뮤시딘**은 뮤코단백질의 disulphide 결합을 분해하여 객담의 점도를 감소시켜 점액을 용해하여 객담의 배출을 용이하게 합니다.
3. **뮤시딘**은 또한 기관지를 청정화하는 기능도 갖고 있어서 호흡기계를 정상적인 생리 상태로 회복시켜 줍니다.

■ **효능 · 효과**

1. 주효능 · 효과
   1) 다음 질환에서의 객담 배출 곤란 : 급 · 만성 기관지염, 기관지확장증, 천식성 기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
   2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

■ **용법 · 용량**

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여합니다.

1. 급성 질환
   성인 : 1 회 200mg, 1 일 3회
   소아 : 6~14 세 1회 200mg, 1 일 2회, 2~5 세 1회 100mg, 1 일 3회
2. 만성 질환
   성인 : 1 회 200mg, 1 일 2회
   소아 : 6~14 세 1회 100mg, 1 일 3회
3. 낭성섬유증
   소아 : 6 세이상 1회 200mg, 1 일 3회, 2~5 세 1회 100mg, 1 일 4회
   연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 위 · 십이지장 궤양 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않습니다.)
3. 부작용
   1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 과민증: 드물게두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지 경련(특히 천식 환자)등이 나타날수있습니다.
   3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있습니다.
4. 상호작용
   경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용 투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다.(적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오.)
5. 임부에 대한 투여
   임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여합니다.
6. 수유부에 대한 투여
   이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.
7. 적용상의 주의
   이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

■ 포장단위

뮤시딘 캡슐 100mg : 10, 50, 100, 500 캡슐
뮤시딘 캡슐 200mg : 10, 50, 100, 500 캡슐

■ 저장방법

기밀용기에 보관하십시오.

■ 사용기한

외부포장을 참조하십시오.

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술부로 문의하여 주시기 바랍니다.(전화:02-3461-2471/4)

작성년월일 : 2001. 10. 18

제조 · 판매원

대한뉴팜(주)

경기도 화성시 향남면 상신리 904-3

30150197-01