타파란 캡슐

전문의약품

Taparan Cap.

분류번호 :232

■ **원료약품의 분량** : 1캡슐 중
테프레논 (식품의약품안전청고시 제1998-127호)·····50mg

■ **성 상**
백색내지 미황백색의 분말이 든 상부 녹색, 하부 백색의 불투명한 경질캡슐제

■ **효능 · 효과**
1. 주효능효과: 위궤양
2. 다음 질환의 위점막 병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선
:급성위염, 만성위염의 급성악화기.

■ **용법 · 용량**
성인 : 테프레논으로서 1일 150밀리그람(3캡슐)을 3회 분할 식후에 경구 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ **사용상의 주의사항**
1. 부작용
1) 소화기계 : 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구갈, 구역, 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
2) 간장 : 때때로 GOT, GPT 치의 가벼운 상승이 일어날 수 있습니다.
3) 정신신경계 : 드물게 두통 등의 증상이 일어날 수 있습니다.
4) 피부 : 드물게 발진, 전신가려움증 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.
5) 기타 : 드물게 총 콜레스테롤치의 상승, 안검의 발적, 열감이 나타날 수 있습니다.

2. 임부에 대한 투여
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

3. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

■ **포장단위**
500캡슐

■ **저장방법**
기밀용기, 실온보관

■ **사용기한**
외부포장을 참조하십시오.

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다.
기타 자세한 문의사항은 당사 학술부로 문의하여 주시기 바랍니다.
(전화 : 02-3461-2471~4)

작성년월일 : 2001. 12. 5

제조 · 판매원
대한뉴팜(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-3