

제산제

타스나정

(탄산수소나트륨)

분류번호 234

일반 의약품

본 타스나정은 현대인의 다양한 식생활과 환경에서 오는 각종 위장장애중 대표적인 증상이라고 할 수 있는 위가 갑갑하면서 속이 쓰린 증상에 잘 듣는 기본적인 제산제입니다.

■ 성분 · 함량 : 1정중

주성분탄산수소나트륨(약전) 500밀리그램

■ 성상

분홍색의 원형 당의정제

■ 효능 · 효과

1. 주요효 효과
 - 1) 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위, 십이지장궤양, 위염, 위산과다
 - 2) 산증의 개선
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다. 요산배설의 촉진과 통풍발작의 예방

■ 용법 · 용량

성인 탄산수소나트륨으로서 1회 0.5~1g 1일 3~5g을 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에 투여하지 말 것.
 - 나트륨 섭취 제한을 필요로 하는 환자(고나트륨혈증, 부종, 임신중독증, 방광결석, 고혈압환자 등)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 심한 소화관궤양 환자
 - 2) 신장에 환자
 - 3) 심기능장애, 폐기능장애 환자
3. 부작용
 - 1) 대사이상 : 알칼리증, 나트륨 축적에 의한 부종등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감압 또는 휴약 등 적절한 처치를 한다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 위부팽만, 트림 드물게 위산의 반동성 분비 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 율혈성심부전, 부종 또는 나트륨정체 뿐만 아니라 감소증 또는 무뇨증이 있는 환자에는 주의하여 투여한다.
 - 2) 과산증에 투여할 때에는 식전 공복에 투여하여 탄산가스의 자극을 적게하기 위하여 다른 제산제와 배합하여 투여한다.
 - 3) 완중증이 있으나 장기 투여로 알칼리증(혈뇨, 구토, 출혈, 탈수증)이 일어날 수 있으므로 주의하여 투여한다.
5. 상호작용
 - 1) 약의 소화관내, 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수, 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 2) 다량의 우유, 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

■ 저장방법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준)에 의하여 엄격한 품질관리하여 제조하였으나 유통과정중에 변질 또는 파손된 제품을 구입하였을때는 구입한 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

악은 어린이의 손이 닿지않는 곳에 보관해야 합니다.