

간은 우리 몸에서 발생하는 각종 독성물질을 해독시키는 역할을 하는데, 이러한 간기능이 저하되면 간내에 각종 독성물질이 쌓여 피로를 유발하고 간세포가 파괴됩니다.

복합 쓸기담 연질캡셀은 간내에 쌓인 독성물질을 제거하는 UDCA(우르소데스옥시콜린산)에 타우린, 백삼, 이노시톨, 항피로 비타민인 질산치아민(비타민 B1)이 복합 처방되어 있어 육체피로, 자양강장, 병중병후 등에 우수한 효과를 발휘합니다.

[원료약품의 분량] 1캡셀 중

우르소데스옥시콜린산(약전)	25mg
타우린(KPC)	300mg
이노시톨(약전)	10mg
백삼건조엑스(6.7→1)(별규)	50mg
질산치아민(약전)	5mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.83mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.17mg

[성상] 갈색의 내용물이 든 (일면)녹황색, (일면)연초교색의 장방형 연질캡셀제

[효능·효과] 자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후, 위장장애, 영양장애, 발열성·소모성질환, 임신·수유기 등의 영양보급

[용법·용량] 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1캡셀을 1일 2회 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 3개월 미만의 영아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
구역, 구토, 묽은 변, 발진, 하리
- 일반적 주의
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[포장단위] 1캡셀, 100캡셀

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온보관(1~30 °C), 제조일로부터 24개월

※ 본 제품은 KGMP(우수의약품 제조관리 기준)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 소비자 상담전화 : 080-777-8285 / www.sspharm.co.kr

807002



제발매원

삼성제약공업주식회사

본사 : 서울특별시 강진구 중곡동 614-4

공정 : 경기도 화성시 안남읍 상신리 905-1

1929년 창립