하나 인산코데인정

마약성 진통·진해제
전문의약품
대한약전
마 약

Brand of Codeine Phosphate Tab. ……분류번호 : 811

하나**인산코데인**정은 기관지염, 폐염 등의 각종 질환이 따르는 기침에 대해 강력한 진정작용을 가지고 있는 마약성 진해제입니다. 하나**인산코데인**정은 연수의 해소 중추 억제작용으로 각종 질환으로 인한 기침에 대해 강력한 진정작용을 나타낼 뿐만 아니라 강한 중추성 진통작용으로 암성통증 치료제로 사용되어질 수 있습니다.

인산코데인은 모르핀에 비해 마약성 부작용이 적어 오심, 구토, 변비 등의 발현율이 낮을 뿐만 아니라 내성 또는 습관성의 위험 부담이 적습니다.

【원료약품 및 그 분량】

1정 중

인산코데인(약전) ……20mg

【성 상】

백색의 정제

【효능 · 효과】

1. 주효능 : 진통, 진해
2. 적응증 : 기관지염, 폐염, 인두염, 후두염, 기관지천식, 기타 질환에 수반되는 기침

【용법 · 용량】

성인 1일 3회, 1회 1정 복용

성인 1회 극량 5정, 1일 극량 15정

【사용상의 주의사항】

1. 금기
   1) 심한 호흡억제가 있는 환자(호흡억제를 증강한다.)
   2) 기관지천식 발작중인 환자(기도분비를 방해한다.)
   3) 심한 간장애가 있는 환자(혼수에 빠지는 일이 있다.)
   4) 만성 폐질환에 속발하는 심부전이 있는 환자
   5) 경련상태(전간증적증, 파상풍, 스트리키닌중독)가 있는 환자(척수의 자극 효과가 나타난다.)
   6) 급성에탄올 중독 환자
   7) 아편 알칼로이드에 대한 과민증의 환자
2. 신중투여
   1) 심장, 간, 신장, 호흡기능장애가 있는 환자
   2) 뇌에 기질적 장애가 있는 환자
   3) 쇼크 상태에 있는 환자
   4) 대사성 아시도시스가 있는 환자
   5) 갑상선기능저하증(점액수종 등)의 환자
   6) 부신피질저하증(아디손병 등)의 환자
   7) 약물의존에 기왕력이 있는 환자
   8) 신생아, 유아, 고령자, 쇠약자
3. 부작용
   1) 의존성 : 반복 사용시에 약물의존이 생기는 일이 있으므로 충분히 관찰하여 신중히 투여한다. 또한 연용중에 투여량의 급격한 감소 또는 중지에 의한 하품, 발한, 재채기, 유루, 오심, 구토, 하리, 복통, 산통, 두통, 불면, 불안, 섬망, 진전, 전신의 근육 및 관절통, 호흡촉박 등의 금단증상이 나타나는 일이 있다.
   2) 호흡순환기계 : 호흡억제, 부정맥, 혈압변동 등의 증상이 나타나는 일이 있다. 또한 본제에 의한 호흡억제에는 마약길항제(레발로판)가 길항한다.
   3) 정신신경계 : 졸음, 현훈, 시조절장애, 발한 등의 증상이 나타나는 일이 있다.

4) 소화기계 : 오심, 구토, 변비 등의 증상이 나타나는 일이 있다.
5) 과민증 : 발진, 소양감 등의 과민증상이 나타나는 일이 있으므로 이런 증상이 나타날 경우에는 중지한다.
6) 기타 : 비뇨장애, 안면홍조가 나타나는 일이 있다.

4. 임부에의 투여
유사화합물(몰핀)의 동물 실험에서 최기형 작용이 보고되어 있으므로 임부 또는 가임부에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

5. 상호작용
다음 의약품과의 병용 또는 음주에 의하여 그 작용이 증가되는 일이 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 좋지만 부득이 투여하는 경우에는 신중히 투여한다. 페노티아진 유도체 및 바르비탈산 등의 중추신경억제제, 흡입마취제, 모노아민산화효소저해제, 삼환계 항우울제, 베타차단제, 쿠마린계 항응혈제.

6. 기타 주의사항
졸음, 현훈이 나타나는 일이 있으므로 본제 투여중인 환자에게는 자동차의 운전 등 위험을 수반하는 기계조작에 종사시키지 않도록 주의한다.

【저장방법】
기밀용기, 실온보관(1℃ ~30℃)

【포장단위】
자사포장단위

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 소비자 상담전화 : 080 - 577 - 8004(수신자 요금부담서비스)

작성년월 : 97. 7.
개정년월 : 02. 9. 〈H04〉

제조·판매원
하나제약주식회사
경기도 화성시 향남면 상신리 907-3