

비스테로이드 소염진통제

필로젠 정(확산형) 10mg 필로젠 캡슐 20mg (Fillozen Tab./Cap.) (피록시캅)

필로젠캡슐·정은 피록시캅제제로서 항염증작용, 진통작용 및 해열작용이 매우 우수한 새로운 화학구조를 가진 비스테로이드성 항염증제제로서 다른 비스테로이드 소염제와 마찬가지로 일반 작용 기전은 염증의 매개체로서 알려진 Prostaglandin(전립선·정낭에서 추출한 성분으로 혈관확장 작용을 나타내며 장 및 자궁근층에 대한 자극제)의 생합성을 억제시키는 작용이 있는 것으로 알려져 있습니다. **필로젠캡슐·정**은 임상 결과 여러가지 요인에 의한 통증(외상 통증, 만성 관절류마티스, 골관절염, 요통성, 강직성 척추염, 급성통풍, 월경곤란증(생리통) 치과영역의 소수술 후 염증 및 발치 후의 동통 등)에 진통효과가 확인되었으며 진통 발현이 신속히 나타납니다. **필로젠캡슐·정**투여로 부종, 홍반, 조직 증식, 열, 통증 모두가 억제되고 염증의 원인에 관계없이 대단히 우수한 효과를 나타냅니다. **필로젠캡슐·정**은 확산형으로 캡슐이나 정제를 먹기가 어려운 상태이거나 먹기가 곤란한 사람에게는 물에 잘 녹기 때문에 물에 녹여 현탁액으로 복용해도 효과가 좋습니다. **필로젠캡슐·정**은 비스테로이드성 항염증약으로 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridinyl)-2H-1,2benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide로 되어 있습니다.

원료약품 및 그 분량: 1정/캡슐 중

필로젠캡슐 20mg : 피록시캅(약전).....	20.0mg
필로젠정 10mg : 피록시캅(약전).....	10.0mg
필로젠정 : 피록시캅(약전).....	20.0mg

성상

필로젠캡슐 20mg : 백색의 결정성 분말 또는 분말을 함유한 상 : 회색, 하 : 백색의 캡슐체
필로젠정 10mg : 미황색의 원형정제
필로젠정 : 연청색의 원형정제

약리작용

필로젠캡슐·정은 비스테로이드성 소염제로서 진통, 해열, 항염증 작용을 함께 갖고 있습니다. 동물실험에서 피록시캅 투여로 부종, 홍반, 조직증식, 열, 통증, 모두가 억제되고 염증의 원인에 관계없이 대단히 우수한 효과를 나타냅니다.

- 항염증작용** : Carragenin축 부종(Rat) 자외선홍반(Marmot)등의 급성염증에 대하여 Indometacin의 약 3배의 항염증 작용을 나타내며 육아형성(Rat)에 대하여 Indometacin과 동등한 억제작용을 나타냅니다. 노산관절염에 대하여 우수한 효과를 나타냅니다. (dog), 또한 염증, 동통에 관하여는 prostaglandin의 생합성을 억제합니다.
- 진통작용** : 진통작용은 Aspirin의 80배나 강한 진통효과를 나타냅니다. (Mouse)Rat의 족저염증성동통(randall-Selitto법)에 대한 억제 작용이 우수합니다. Adjuvant 관절염(Rat)에 대하여 동통 억제작용이 매우 우수합니다.
- 해열작용** : 해열작용은 Aspirin의 약 10배나 되고 정상 체온(Rat)에 대하여 영향을 주지 않습니다.
- 체내동통** : 혈중농도 반감기는 사람에게서 약 50시간이며 1일 1회 투여로 하루종일 안정된 혈중농도가 지속됩니다. 1일 20mg으로 1년간 계속 치료할 때의 혈중농도는 첫번째 도달된 정상상태(steady state)의 혈중농도와 비슷합니다. 대부분이 대사되며 투여량은 5%미만이 소변과 대변중에 활성으로 배설되고 한가지 중요한 대사과정은 화학구조 측쇄의 pyridyl ring이 수산화되어 Glucuronic acid와 포함하여 뇨로 배설됩니다.

효능·효과

류마티스성 관절염, 골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환), 강직성척추염, 요통증, 견관절주위염, 경견관절후군, 급성근골격질항, 급성통풍, 외상후, 수술후, 발치후의 진통, 소염, 원발성 월경곤란증(생리통), (필로젠 캡슐 10mg) 급성상기도염

용법·용량

- 류마티스성 관절염, 골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환) 요통증, 견관절주위염, 경견관절후군, 강직성 척추염 : 성인 피록시캅으로서 1회 20mg 1일 1회 경구투여합니다. 필요한 경우 1일 30mg을 1회 투여하거나 수회 분할 투여합니다.
- 급성근골격질항 : 처음 2일간 1일 40mg을 경구 투여하거나 수회 분할 투여하고 다음 7 ~ 14일간을 20mg으로 감량합니다.
- 급성통풍 : 첫날 1회 40mg을 경구투여하고 다음 4 ~ 6일간 1일 40mg을 1회 경구투여하거나 수회 분할 투여합니다. 장기 투여는 피하는 것이 바람직합니다.
- 외상후, 수술후, 발치후의 진통·소염 : 처음 2일간 1일 40mg을 1회 경구투여하거나 수회 분할 투여하고 다음부터는 1일 20mg으로 감량합니다.
- 원발성 월경곤란증(생리통) : 처음 2일간 1일 40mg을 1회 경구투여하고 다음 2일간 1일 20mg으로 감량합니다.
- 급성상기도염 : 1회 10 ~ 20mg으로 1일 1회 경구투여합니다. 연령 및 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

- 경고
 - 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
 - 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있습니다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도

있습니다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용됩니다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 합니다.

- 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있습니다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있습니다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아닙니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 합니다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있습니다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 합니다.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 소화성궤양 환자
 - 심한 혈액이상 환자
 - 심한 간장애 환자
 - 심한 신장애 환자
 - 심한 심기능부전 환자
 - 심한 고혈압 환자
 - 이 약의 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 의하여 천식, 비염, 혈관부종, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시 양 반응이 드물게 보고되었습니다.)
 - 광상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
 - 항응고제를 투여받고 있는 환자
 - 임신말기의 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 소화성궤양의 병력이 있는 환자
 - 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
 - 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
 - 심기능부전 환자
 - 고혈압 환자
 - 기관지천식 환자
 - 고령자
- 이상반응
 - 소화기계 : 때때로 소화성궤양(천공을 수반할 수 있습니다), 드물게 토혈, 하혈 등의 위장출혈이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 투여를 중지합니다. 또한 때때로 위복부통, 위부불쾌감, 식욕부진, 구역, 구토, 설사, 연변, 구내염, 소화불량, 고장 드물게 변비, 설염 등이 나타날 수 있습니다. 이 약을 30mg씩 장기투여하거나 30mg 이상 투여시에는 위장관 이상반응의 위험이 증가됩니다.
 - 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 조치를 합니다.
 - 피부 : 드물게 스티븐스-존슨증후군(피부점막만증후군), 리엘증후군(중독성 표피괴사증), 광과민증 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다. 또한 드물게 손톱박리증, 탈모, 대소수포성 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 혈액 : 드물게 빈혈, 과립구감소, 혈소판감소, 재생불량성빈혈, 골수기능억제, 자반, 백혈구감소, 호산구증다, 혈소판기능저하(출혈시간의 연장) 등이 나타날 수 있습니다.
 - 간장 : 드물게 황달, 간염, 때때로 GOT, GPT, AL-P, LDH의 상승 등이 나타날 수 있습니다.
 - 신장 : 드물게 급성신부전, 네프로제증후군을 일으킬 수 있으므로 핏뇨, 혈뇨, 요단백, BUN, 혈중크레아티닌상승, 고칼륨혈증, 저알부민혈증 등이 나타날 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 조치를 합니다.
 - 과민증 : 때때로 발진, 습진, 가려움증 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다. 또한 드물게 기관지경련, 두드러기, 혈관부종, 혈관염, 혈청병이 보고되어 있습니다.
 - 정신신경계 : 때때로 졸음, 현기, 두통, 이명 드물게 수족의 저림, 우울, 신경질, 환각, 감정변화, 정신혼란이 나타날 수 있습니다.
 - 기타 : 때때로 부종, 구갈, 전신권태감, 시야흐림, 눈의 자극감 드물게 어깨결림, 발열, 심계항진, 호흡곤란 등이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 합니다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여합니다.
- 2) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법에 유의합니다.
- 3) 만성질환(만성관절류마티스, 변형성관절증 등)에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다.
 - ① 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사 등 혈액 검사, 간기능 검사, 변압혈 검사 등)를 실시하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 합니다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 합니다.
 - ② 약물요법 이외의 치료법도 고려합니다.
- 4) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려합니다.
 - ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여합니다.
 - ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피합니다.
 - ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시합니다.
- 5) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 발현에 유의합니다.
- 6) 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불현성화하여 통증성 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있습니다. 이 약을 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여합니다.
- 7) 이 약은 출혈시간을 연장시키므로 출혈시간을 결정할 필요가 있을 경우에는 주의합니다.
- 8) 위장관계 이상반응 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 궤양성 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에게 처방시 극심한 주의를 기울여야 합니다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였습니다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용 알콜 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있습니다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 합니다.
- 9) 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있습니다. 치아짓게 이노제 또는 루프형 이노제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있습니다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 합니다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 합니다.
- 10) 울혈성심부전 및 부종: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었습니다. 이 약은 체액저류 또는 심부전이 있는 환자에서 신중히 투여해야 합니다.
- 11) 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유두괴사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있습니다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 신기능 부전 환자, 간기능 부전 환자, 이노제나 ACE 저해제를 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요합니다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복됩니다.
- 12) 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없습니다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않습니다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 합니다.
- 13) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치의 상승이 나타날 수 있습니다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있습니다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전격성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었습니다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에 있어서는 투여기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중지합니다.
- 14) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마토크리치 검사를 해야 합니다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었습니다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적입니다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 합니다.
- 15) 아나필락시양 반응 : 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시양 반응은 약물에 노출된 경험이 없는 환자에서도 일어날 수 있습니다. 이러한 복합 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특이적 반응을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 천식 환자에게 전형적으로 발생합니다. 이러한 아나필락시양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 합니다.
- 16) 피부반응: 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있습니다. 이들 중대한 이상반응은 경도 증상없이 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생합니다. 환자는 중대한 피부 발현 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 합니다.
- 17) 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있습니다. 아스피린 민감성 천식 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지

경련과 관련될 수 있습니다. 이러한 아스피린 민감성 환자에게서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었습니다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용하여야 합니다.

- 18) 이 약은 코르티코이드 제제를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없습니다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드 - 반응성 질환의 악화를 초래할 수 있습니다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 합니다.

6. 상호작용

- 1) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직합니다.
- 2) 이 약은 높은 단백결합을 나타내므로 다른 단백결합제를 치환시킬 수 있습니다. 단백결합이 높은 약물과 병용투여시 주의하여 용량을 조절합니다.
- 3) 설폰아미드계 혈당강화제와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여합니다.
- 4) ACE 저해제 : 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 합니다.
- 5) 푸로세미드 및 치아짓게 이노제
 - ① 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 푸로세미드 및 치아짓게 이노제의 나트륨노배설 효과가 감소할 수 있음이 확인되었습니다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 합니다.
 - ② 이 약은 치아짓게 이노제의 작용을 감소시킬 수 있습니다.
- 6) 아스피린 : 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없습니다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으며 양쪽 또는 한쪽 의약품의 이상 반응 발현정도가 증가될 수 있으므로 두 약물은 병용투여하지 않는 것이 바람직합니다.
- 7) 리튬 : 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있습니다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의깊게 관찰해야 합니다.
- 8) 메토폭세이트 : 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 메토폭세이트의 독성이 증가될 수 있으므로 두 약물을 병용투여하는 경우 주의하도록 합니다.
- 9) 쿠마린계 항응혈제(와파린 등)
 - ① 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있습니다.
 - ② 쿠마린계 항응혈제와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여합니다.
- 10) 제산제 또는 디곡신과 병용투여시 이 약의 혈장농도에 대한 영향은 없습니다.
7. 임부에 대한 투여
 - 1) 이 약은 임부에 투여한 임상자료는 없습니다. 동물실험에서 주산기 투여에 의한 분만 지연, 난산의 발생 빈도 증가 및 새끼의 생존율 감소가 보고되어 있으므로 임신말기에는 이 약을 투여하지 않습니다.
 - 2) 임신말기의 랫드에 투여한 실험에서 태아의 동맥관수축이 보고되어 있습니다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있으므로 이 약은 임부에 투여를 피해야 합니다.
 - 3) 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
8. 수유부에 대한 투여
이 약은 모유중으로 이행되며 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에게는 투여하지 않습니다.
9. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 부득이 투여하는 경우에는 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 발현에 특히 유의합니다.
10. 고령자에 대한 투여
고령자는 천공을 수반한 소화성궤양, 위장출혈 등이 나타내기 쉬우므로 이상반응의 발현에 특히 유의하고 필요한 최소량으로 투여를 시작하는 등 신중히 투여합니다.
11. 과량투여시의 처치
이 약을 과량투여시 보조치료 및 대증치료가 필요합니다. 예비시험시 활성탄의 투여로 피록시캄의 재흡수를 감소시킬 수 있어 유효작용약물의 총량을 낮출 수 있습니다.
12. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

저장방법

필로젠정 : 밀폐용기 상온에 저장

필로젠정 10mg : 차광기밀용기

필로젠캡슐 20mg : 차광기밀용기

※ 본 의약품은 우수의약품제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제 품입니다. 만약 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통하여 교환 하여 드립니다.

고객문의

주소 : 서울시 서초구 양재2동 324-1 전화 : 02)2057-9980(대)