KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품 제조기준업체
KGMP

일반의약품
분류번호 : 234

변비 · 제산 · 완하위장제

신일엠정

수산화마그네슘

신일엠정은 현대문명이 발달됨에 따라 과음, 불규칙적인 식사, 자극성 음식물의 섭취, 신경과민등 여러 원인으로 자신도 모르는 사이에 위산의 과다분비로 만성질환의 형태로 나타납니다.

신일엠정은 위에 자극을 주지않는 제산작용과 부드러운 완하작용 그리고 가벼운 소염작용을 가지고 있는 마그네시움 제제로서 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다의 증상을 개선하고 특히 변비를 치료하여 주는 약제입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

수산화마그네슘(유.에스.피.)·····500.0mg

【성　　상】 백색의 원형정제

【약리작용 및 특장】

1. 신속하고도 지속적인 제산작용으로 위산의 작용을 균형있게 조절할 뿐만 아니라 과잉분비 된 위산을 중화시켜 정상적인 산도로 회복시킴으로써 소화흡수를 촉진시킵니다.
2. 장관으로부터 수분의 흡수를 억제할 뿐만 아니라 오히려 체내의 수분을 장관으로 빨아냄으로써 수분이 증가되어 부드러운 설사를 일으키게 합니다. 따라서 위와 장의 점막을 자극하거나 충혈시키는 일이 없고 설사약을 복용하였을 때 흔히 일어나는 하복통등 불쾌한 증상이 거의없습니다.
3. 위점막을 피복하여 궤양부위를 보호함으로써 동통을 억제하며 조직재생을 촉진시킴으로써 점막염증에 소염의 효과가 있습니다.

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과
   1) 변비증
   2) 다음 증상의 제산작용 및 증상의 개선 : 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다.

【용법 · 용량】

성인

1) 변비증 : 1일 2~4정(1~2g)을 1~2회 분할 경구투여하십시오.
2) 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다 : 수산화마그네슘으로서 1일 2~5정(1~2.5g)을 수회 분할 경구투여하십시오. 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 신장애 환자(심한 심기능장애 환자에서 고마그네슘혈증이 나타날 수 있다.)
   2) 설사환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 심기능 장애 환자
   2) 고마그네슘혈증 환자
3. 부작용
   1) 소화기계 : 때때로 설사 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 대사이상 : 장기 대량투여에 의하여 고마그네슘혈증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 하십시오.
4. 일반적 주의
   마그네슘 중독증상이 나타나면 칼륨염을 주사하십시오.
5. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여하지 마십시오.
   2) 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 · 체액의 pH상승에 의해 병용 약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
   3) 다량의 우유 · 칼슘제제와 병용시 우유 알칼리 증후군(고칼슘혈증, 고질소혈증, 알카리증 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【복용전 참고사항】

1. 통상적으로 유리컵 하나 정도의 물과 같이 복용하십시오.
2. 설사약으로 사용할 때는 많은 물과 함께 복용하시면 더욱 효과적입니다.
3. 우유와 함께 복용하여도 효과에는 차이가 없습니다.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.
연락처 : 개발부 (02)2242-0491~9

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1
http://www.sinilpharm.com

작성년월일 : 020123