전문의약품
(한외마약)

진 해 제

네오메디코푸 정

성분 · 함량 1정중

주석산수소디히드로코데인 (B.P.) ····· 5mg
말레인산클로르페니라민 (약전) ····· 1.5mg
디엘염산메칠에페드린 (약전) ····· 17.5mg
무수카페인 (약전) ····· 10mg

● 성상 : 연분홍색의 원형정제

약리작용 및 특징

● **주석산 수소디히드로코데인**
진해제로서 코데인보다 진해작용이 2~3배 강력하고 변비 및 일반 부작용이 적으며 진통작용도 우수합니다.

● **말레인산클로르페니라민**
교감신경의 말단을 자극하여 기관지 경련을 제거하고 졸음(睡氣) 등의 부작용이 적으며, 소량으로도 항히스타민 작용을 나타냅니다.

● **디엘염산메칠에페드린**
에페드린보다 기관지근 확장작용이 강력하며 동시에 혈압상승, 심계항진, 두통 등과 같은 부작용이 없으므로 노인이나 고혈압 환자에게도 투여할 수 있습니다.

● **무수카페인**
뇌혈관의 긴장을 완화하며 혈류를 조정하고, 다른 유효성분의 작용을 증강시킵니다.

효능 · 효과 기침, 가래

용법 · 용량

1일 3회 식후 복용함
1회 용량 : 성인 ····· 2정
11세이상 15세미만 ····· 1~2정
8세이상 11세미만 ····· 1정

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증등)을 일으킨 일이 있는 사람.
3) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
4) 심장에 장해가 있는 사람, 혈압이 높은 사람, 또는 고령자 (염산페닐프로파놀아민, 염산메톡시페나민, 염산메칠에페드린, 염산에페드린, 염산슈도에페드린을 함유하는 제제).
5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부.
6) 의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 다음 약들과 동시에 복용하지 마십시오.
다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등.
3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시키십시오.
5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상도 1세미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는가 좋습니다.

3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
3) 수회복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의
1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 될수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온보관

포장단위 50정, 300정, 500정, 1000정

※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
본제품은 소비자피해보상규정(재정경제원 고시)에 의거 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 수신자부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.

060900

제조 및 판매
BORYUNG
보령제약주식회사
경기도 안산시 신길동 1122-3