KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품 제조지정업체
KGMP

진해 • 거담제

후리코정

Frico tablet

전문의약품
한외마약
분류번호 : 222

기침은 호흡기도내의 분비물이나 자극에 의해 유발되어, 기도내에 축적된 이물과 분비물을 제거하여 기도를 유해 환경에서 보호하는 방어기능의 하나입니다.

일반적으로 기침은 상기도 감염이나 기관지염 등의 호흡기질환의 한 증상으로 나타나는데, 열도 없고 수면에도 지장이 없는 가벼운 기침도 있지만 심한 경우에는 밤에 잠을 이루지 못하고 발작적인 심한 기침으로 인해 구토까지 유발되어 어려움을 겪는 경우도 있습니다.

이러한 발작적이고 지속적인 기침은 환자에게 고통을 주며, 기침에 의한 생리적인 거담 작용이 균형이 잡히지 않으면 더 이상 증상을 호전시키지 못하고 오히려 호흡기 상태를 악화시킬 수도 있으므로 이런 경우에는 방치해 두지 말고 적절한 방법으로 기침을 멈추게 해야 합니다.

후리코정은 직접 해소 중추에 작용하여 강한 진해효과를 나타내며 부작용이 적은 주석산수소디히드로코데인, 기관지 확장제인 dℓ-염산메칠에페드린, 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민 및 카페인이 고루 배합되어 기침 • 가래에 우수한 효과를 나타냅니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

주석산수소디히드로코데인(Dihydrocodeine Bitartrate)(B.P.) ····· 5mg
말레인산클로르페니라민(Chlorpheniramine Maleate)(약 전) ····· 1.5mg
dℓ-염산메칠에페드린(dℓ-Methylephedrine • HCl)(약 전) ····· 17.5mg
~~무수카페인(Anhydrous Caffeine)(약 전) ····· 10mg~~

【성　　상】 등황색의 원형정제

【약리작용 및 특장】

1. 후리코정은 연수(延髓)의 해소 중추에 작용하여 기침 반사 발생에 대한 역치(閾値)를 증가시켜 기침을 억제하며 호흡 중추는 거의 억제하지 않습니다.
   후리코정은 기관지염, 인후염 등의 호흡기질환에서 나타나는 자극적이고 지속적인 기침을 억제합니다.
2. 후리코정은 β-adrenergic receptor에 작용하여 기관지를 확장하여 , 발작성 기침을 억제하며, 호흡을 부드럽게 하고 객담 배출을 용이하게 합니다.
3. 후리코정은 소량으로 강력한 효과를 나타내며 다른 항히스타민제보다 비교적 수기나 현운의 부작용이 약한 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민을 함유하여 기침 등의 증상을 제거합니다.
4. 후리코정은 중추신경계에 작용하여 정신기능을 항진시켜 감기나 호흡기 질환에 수반되는 두통, 두중의 증상을 완화시켜 줍니다.

【효능 • 효과】

기침, 가래

【용법 • 용량】

성인 : 1회 2정 1일 3회 식후 복용하십시오.
소아 : 11세이상-15세 미만 : 1회 1-2정
　　8세이상-11세 미만 : 1회 1정

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   이 약은 황색 4호 (타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

2. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.
   1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
   2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
   3) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
   4) 심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람, 또는 고령자
   5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
   6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 용법 용량을 잘 지키십시오.
   2) 다음 약들과 동시에 복용하지 마십시오.
      다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등
   3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
   4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시키십시오.
   5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월이상~1세미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는게 좋습니다.
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의 하십시오.
   1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
   2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
   3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
5. 보관 및 취급상의 주의
   1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

종이
분리배출

개정년월일 : 2003. 11. 20