

# 보령 기승환

보령 기승환은 옛부터 쓰여온 사향, 우담, 백상, 침향등의 생약을 원료로 하여 제조하고 있습니다. 보령 기승환은 한방생 약제로서 소아의 신체저항력을 증진시켜 기능을 정상화하는 소아양약입니다. 보령 기승환은 복용하기 쉬운 환제로서 위장에서의 흡수가 빠르며, 약을 먹기 싫어하는 유아라도 쉽게 사용할 수 있습니다. 보령 기승환은 소아의 다음과 같은 증상에 유효한 소아용 제제입니다.

- 신경과민, 소아야제 (夜啼), 소아의 신경질  
정신불안이나 이상흥분 등에 의한 소아신경증, 속담에 "가위놀린다" 하는 증상 (자는 어린이가 꿈에서 무서운 경우를 당하여 몸을 꿈쩍 못하고 소리지르는 경우), 소아야제 (밤에 깨달없이 울고 보채는 경우), 안색이 나빠지고, 손가락을 빨며, 손톱을 이로 뜯거나 기분이 자주 달라지는 등의 증상에도 유효합니다.
- 발열  
감기 및 감기로 인한 발열
- 소화불량, 토사 (吐瀉), 토유, 위장하악  
저항력이 약한 유아의 소화기 계통의 증상, 설사, 푸른 똥, 소화불량, 토유(젖을 토하는 경우), 식욕부진, 위장하악 (소이는 변한 음식이나 계절이 바뀔때나 더울때 특히 설사를 자주하고 소화가 잘 안되며 식욕이 떨어집니다.)

## 성분·함량

1환중

우담 (생규) .....	0.015mg	사향 (생규) .....	0.013mg
인삼 (KP) .....	0.7295mg	침향 (생규) .....	0.26mg

(진세노사이드 Rb1으로서 1.5μg)

- 성상 : 본품은 은색의 환제로서 내부는 갈색입니다. 고미를 갖고 있으며 특이한 향기가 있습니다.

## 효능·효과

경기, 토유, 설사, 소화불량, 식욕부진, 위장하악, 감기, 감기로인한 발열, 소아의 신경질, 간기, 아음, 침냉

## 용법·용량

1회 복용량

소아 : 11~14세 .....	18~20환	7~10세 .....	15~17환	4~6세 .....	11~14환
2~3세 .....	7~10환	1세 .....	4~6환	1세미만 .....	1~3환

- 1일 3회 식전 또는 식간에 복용하십시오.
- 유아는 젖을 먹일때 그대로 또는 가루로 하여 젖꼭지에 발라서 빨리십시오.
- 뚜껑을 돌리면서 열어주십시오.

## 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
  - 1) 심한 설사 또는 고열이 있는 환자.
  - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자.
- 일반적 주의
  - 1) 정해진 용법, 용량을 잘 지키십시오.
  - 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 투여하십시오.
  - 3) 수 회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 저장상의 주의사항
  - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
  - 3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

**저장방법** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**포장단위** 165립, 275립

- ※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 재검정제부 고시에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- ※ 본 첨부서 작성일자(2007년 10월 1일)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 [www.boryung.co.kr](http://www.boryung.co.kr) 또는 소비자상담실 수신자부담전화 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

011007

제조·판매장  
**BORYUNG**  
보령제약

경기도 안산시 단원구 신원동 1122-3  
[www.boryung.co.kr](http://www.boryung.co.kr)