전문의약품

분류번호 : 114 해열, 진통, 소염제

클란자정

Clanza Tabs.
(Aceclofenac 100mg)

[원료약품 및 그 분량] 1정 중
아세클로페낙(E.P.) ····· 100 mg

[성 상]
백색의 원형 필름코팅 정제

[효능 · 효과]
– 치통, 외상후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 회음 외측 절개수술후, 분만 후, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증
– 류마티양 관절염, 강직성 척추염, 골관절염 및 견갑상완골의 관절주위염

[용법 · 용량]
통상, 성인의 경우 1회 1정씩, 1일 2회(12시간마다) 복용한다. 단, 의사나 약사의 지시에 따라 복용량과 횟수를 조절할 수 있다.
반드시 정제를 씹어 먹지 않도록 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음의 환자에게는 투여하지 말 것
1) 본 제제 또는 같은 계열의 일부약물(디클로페낙)에 대해 알레르기증상이 있는 환자
2) 다른 비스테로이드성 소염제와 마찬가지로, 아세틸살리실산 및 기타 프로스타글란딘 합성효소 저해작용을 갖는 약물에 의해 천식위험의 증가, 담마진 또는 급성 비염을 일으킬 수 있는 천식환자
3) 활동성의 위십이지장 궤양이 있는 환자

3. 다음의 환자에게는 신중히 투여할 것
1) 위장관의 질병이나 과거 위궤양의 경험이 있는 환자
2) 심한 간경변, 심장 또는 신장의 병변을 가진 환자
3) 이뇨제를 복용중인 환자
4) 외과적 처치후에 회복기에 있는 환자
5) 고령자

4. 부작용
일시적으로 경미한 위복부통증, 구토, 오심, 위부포만감 등이 나타나며 때로 발진, 발적, 담마진, 야뇨현상의 증가를 비롯하여 두통, 현기증, 졸음 또는 피로가 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의
현기증 혹은 기타 중추신경계의 장애를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나, 어떤 위험한 기계를 다루는 일도 해서는 안되며 특별한 주의를 요하는 환경을 피할 것.

6. 상호작용
다른 약물과의 상호작용은 아직까지 알려진 바 없으나, 환자가 다른 약물 특히, 리튬이나 digoxin, 항응고제, 경구용 당뇨병용제, 이뇨제 또는 다른 진통제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상의하도록 할 것

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
1) 임신부 또는 수유부에 대한 안전성은 현재까지 알려진 자료로는 충분히 확립되어 있지 않으므로 임신 혹은 수유중인 경우에는 사용하지 않는 것이 좋다.
2) 6세 이하의 소아에 대해서는 정해진 복용량이나 적응증이 설정되어 있지 않다.

8. 과량투여시의 처치
과량복용으로 인한 전형적인 증상은 알려져 있지 않으나. 실수로 과량복용시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 해야 하며, 위장관자극, 저혈압, 호흡저하, 경련등에 대비하도록 할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관

[포장단위] 10, 30, 60, 100, 500, 1000 정

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 마케팅부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

TS414-21209

한국유나이티드제약 (주)
충남 연기군 전동면 노장리 404-10

우수의약품 제조관리기준 KGMP 적격업체