

소화불량 · 과식 · 위산과다 · 속쓰림

일반의약품
P0807-09

노루모[®]에이^산정

“노루모 에이”는 제산제인 탄산수소나트륨, 메타규산알루미늄산마그네슘, 수산화알루미늄산마그네슘, 소화효소제인 비오디아스타제, 건위제인 육계가루, 건강가루, 용담가루, 엘-멘톨 그리고 진경제인 스코폴리아엑스산이 이상적으로 배합되어 있어 현대인에게 나타나기 쉬운 위장장애를 효과적으로 개선시켜 줍니다.

성상 백색 원형필름코팅정(정제), 백색과 갈색의 분말이 혼합된 산제

성분 · 함량

(정제)		(산제)	
1정 중		1 포(1.5g)중	
탄산수소나트륨(KP)	200mg	탄산수소나트륨(KP)	400mg
메타규산알루미늄산마그네슘(KPC)	100mg	메타규산알루미늄산마그네슘(KPC)	200mg
수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	125mg	수산화알루미늄산마그네슘(KPC)	250mg
스코폴리아엑스10배산(KP)	50mg	스코폴리아엑스산(KP)	100mg
비오디아스타제 1000(별규)	30mg	비오디아스타제 1000(별규)	60mg
S-아밀라제 630단위		S-아밀라제 1260단위	
α-아밀라제 18000단위		α-아밀라제 36000단위	
프로테아제 42단위		프로테아제 84단위	
육계가루(KPC)	50mg	육계가루(KPC)	100mg
건강가루(KPC)	17.5mg	건강가루(KPC)	35mg
용담가루(KPC)	8.5mg	용담가루(KPC)	17mg
엘-멘톨(KP)	1.5mg	엘-멘톨(KP)	3mg

효능 · 효과 위산과다(위염, 위·십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진

용법 · 용량 (정제)
성인: 1회2정
소아: 1회 11~14세 1~2정, 8~10세 1정 1일 3회 식후에 복용합니다.
(산제)
성인: 1회 1포(1.5g)
소아: 1회 11~14세 2/3포(1.0g) 8~10세 1/2포(0.8g)
5~7세 1/3포(0.5g) 3~4세 1/4포(0.4g)
1~2세 1/5포(0.3g)
1일 3회 식후에 복용합니다.

약리작용

1. 제산 및 점막보호작용
탄산수소나트륨, 메타규산알루미늄산마그네슘, 수산화알루미늄산마그네슘이 과잉의 위산을 중화시키고 위점막을 피복 보호하여 위장의 자극을 감소시킴으로써 속쓰림, 신트림, 소화불량등을 없애주고 위의 운동과 기능을 정상적으로 유지시켜 줍니다.

사용상의 주의사항

2. 소화작용
비오디아스타제가 음식물의 소화흡수를 용이하게 하여 식욕증진 및 소화기능을 원활히 합니다.
3. 건위작용
육계가루, 건강가루, 용담가루, 엘-멘톨이 소화액분비를 촉진하고 위장운동을 강화시켜 무기력한 위장에 활력을 주며, 위장기능을 활성화시켜 줍니다.
4. 진경작용
스코폴리아엑스산이 위장관평활근의 경련을 완화시켜줌으로써 위산과다, 위·십이지장궤양에서 오는 통증과 경련을 제거시켜 줍니다.

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자.
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
투석요법을 받고 있는 환자.
3. 부작용
 - 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.
 - 2) 이 약을 투여하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
 - 2) 장기연용을 하지 마십시오.
 - 3) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 4) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 - 5) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.
5. 상호작용 : 위장 진통·진경제와 병용투여하지 마십시오.
6. 소아에 대한 투여 : 산제의 경우 3개월 미만의 영아에게는 투여하지 마십시오. 또 3개월 이상이라도 1세미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 투여하지 마십시오.
정제의 경우 7세이하의 영·유아에게 투여하지 마십시오.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

포장단위

정제) 10, 20, 100, 200, 500, 1000정 산제) 자서포장단위

저장방법

정제 : 기밀용기, 실온보관 산제 : 기밀용기
만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※설명서 작성년월일 : 2008.07.17

 **일양약품주식회사**
경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr