이모튼® 캅셀

일반의약품

아보카도-소야
불검화물의 추출물

작 용 · 특 성 : 골관절염을 흔히 '닳고 헤진 연골'에 의한 통증과 운동장해 질환이라고 하는데, **이모튼 캅셀**은 다음과 같은 약리작용을 통해 골관절염을 근본적으로 치료합니다.

1.연골 파괴 억제

연골파괴를 가속화시키는 연골파괴효소(Metalloproteinase), IL-1, PGE_2 등을 억제하여 연골기질의 파괴를 억제합니다.

2.연골 생합성 촉진

연골세포의 분화와 증식을 촉진시킵니다.

연골기질성분인 collagen, proteoglycan의 합성을 촉진시킵니다.

이모튼은 아보카도(Avocado)와 소야(Soya)의 불검화물 추출물을 주성분으로 하는 식물성 제제로 부작용이 없어서 노인환자도 안전하게 장기복용할 수 있는 제제입니다.

이모튼은 1일 1캅셀의 간편한 용법으로 골관절염의 꾸준한 치료를 도움으로서 골관절염의 통증을 감소시키고 활동을 개선시킵니다.

이모튼은 액상물질이 경질캅셀내에 충전되어 있어서 흡수, 분포가 양호하며 20년이상의 연구로 약효와 안전성이 충분히 입증된 제제입니다.

조 성 · 성 상 : **1. 원료약품의 분량 :** 매 캅셀당

주성분 : 아보카도 - 소야 불검화물의 추출물(별규) ····· 300mg

2. 성상 : 갈색내용물이 들어있는 상의 오렌지색, 하의 백색의 경질 캅셀입니다.(갈색 내용물로 인해 하의 백색캅셀이 회색으로 보임)

효 능 · 효 과 : 골관절염 통증의 보조요법

치주증(치조 농루)에 의한 출혈 및 통증의 보조요법

용 법 · 용 량 : 1일 1회 1캅셀을 식간에 복용하십시오.

사 용 상 의 주 의 사 항 :

1. 다음을 주의하여 사용하십시오.

1) 다른 치료를 함께 받는 경우 약제 상호작용을 피하기 위해 치료에 관해 의사 또는 약사와 상의하십시오.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 기타 의심의 소지가 있는 경우 의사 또는 약사와 상의하십시오.

2. 부작용

어떤 사람은 지질성 냄새가 역류될 수 있으나, 이 경우 식사중에 복용하면 해소됩니다.

3. 임부에 대한 투여

임부에 대한 사용경험이 적으므로, 되도록이면 투여를 피합니다.

저 장 방 법 : 기밀용기에 넣어 실온에 보관하십시오.

포 장 단 위 : 이모튼 캅셀 ····· 15, 30, 60캅셀

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

® = 등록상표

I05 · 102896

제조 및 판매원:

종 근 당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080 (수신자 부담)

원제조원 : 프랑스

EXPANSCIENCE™
LABORATOIRES