

제일알맥스[®] 정500mg

(알마게이트)

제일 알맥스 정500mg은 Spain의 Almirall사가 개발한 위장병 치료제로서 과도하게 분비된 위산을 중화시키며 펩신의 불활성화, 담즙산 중화활동이 뛰어나 신속하고 지속적인 제산 작용을 나타냄과 함께 부작용을 감소시켜 내약성을 높인 우수한 제제입니다.

【원료약품의 분량】 이 약 1정(570mg) 중 알마게이트(식품의약품 안전청고시 제98-127호)500mg

【성 상】 이 약은 백색의 원형 정제입니다.

【약리작용 및 특성】

1. **제일 알맥스 정500mg**은 펩신 및 담즙의 활성을 억제함으로써 강력한 제산작용을 발휘합니다.
2. **제일 알맥스 정500mg**은 산반동을 일으키지 않습니다.
3. **제일 알맥스 정500mg**은 위장관 운동에 영향을 주는 일반제산제와는 달리 배변을 정상화시키는 효과를 가지고 있기 때문에 변비를 유발시키지 않습니다.
4. **제일 알맥스 정500mg**은 매우 적은 양의 나트륨만을 함유하므로 나트륨섭취를 제한받는 환자에서 있어서도 안전하게 사용할 수 있습니다.

【효능·효과】

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다(속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림), 역류성 식도염

【용법·용량】

성인:1회 2정씩, 1일 4회, 식후 1~2시간 및 취침시에 씹어서 경구투여하십시오.
 소아(6~12세):성인용량의 1/2을 투여하십시오.
 연령·증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 부작용
 소화기계 : 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있습니다.
3. 일반적 주의
 1)정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 2)소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
 3)2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
4. 상호 작용
 1)테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용 투여하지 마십시오.
 2)이 약의 흡착작용 또는 소화관 내 체액의 pH 상승에 의해 병용약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
5. 저장상의 주의사항
 1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 2)직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3)오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10, 30, 100, 300, 500, 1000정

"약국 등의 개설자에 한하여 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품 등은 본사 마케팅부(수신자 부담:080-555-7171)에서 교환해 드립니다."

작성일 : 2005. 7.
 AO-B-0000-F7-03

"이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다."

제조판매원



제일약품 주식회사

본사:서울특별시 서초구 반포동 745-5
 공장:경기도 용인시 백암면 근곡리 117-1



원료공급원
LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.