



기타의 화학요법제(629)
제일타리비드® 정 100mg, 200mg (오픈록사신)
JEIL TARIVID® Tab.
(Ofloxacin)

【개발경위, 개요 및 특징】

제일타리비드 정은 일본 제일제약에서 개발한 Pyridone Carboxylic acid계의 광범위 경구용 항균제입니다.
제일타리비드 정은 대장균을 비롯한 Gram 음성균에 대해 종래의 동계 약제보다 강한 항균력을 나타낼 뿐만 아니라 포도구균속, 용혈성연쇄구균, 장구균 등의 Gram 양성균에 대해서도 강한 항균력을 나타냅니다. 또한 제일 타리비드 정은 투여 후 신속히 각조직에 고농도로 이행하여 축적되지 않고 거의 그대로 대부분이 요중으로 배설되므로 요로, 성기에서 높은 항균력을 나타냅니다.

【원료 약품의 분량】

구 분	타리비드정100mg	타리비드정200mg
이 약 1정	204mg 중	280mg 중
오픈록사신(USP)	100.0mg	200.0mg

【성 상】 이 약은 백색 내지 미황백색의 원형 필름코팅정입니다.

【약리작용】

- 제일타리비드 정**은 Gram 양·음성균에 대해 광범위한 항균 Spectrum을 가지며 포도구균속, 용혈성연쇄구균, 장구균에 대하여 norfloxacin의 2~4배의 항균활성을 나타내고 대장균 등의 장내세균과 녹농균을 포함한 포도당비발효 Gram 음성균, 인플루엔자균, 임균 등에 대해서도 norfloxacin과 같은 높은 항균활성을 나타냅니다. 특히 nalidixic acid내성의 장내세균과 ampicillin내성인균, gentamicin내성의 녹농균에 대해서 우수한 항균활성을 나타냅니다.
- 제일타리비드 정**은 norfloxacin의 2~4배, piperidic acid보다 강한 감염 방어효과를 나타냅니다.
- 제일타리비드 정**의 세균에 대한 작용기전은 DNA합성을 특이적으로 저해하는 것으로 생각되며 항균작용은 살균적이며 MIC 농도에서 용균이 인정됩니다.
- 제일타리비드 정**의 내성에 있어서 자연내성의 발현은 인정되지 않습니다.

【효능·효과】

(유효균종)

포도구균, 화농연쇄구균, 용혈성연쇄구균, 장내구균, 폐렴구균, 폐도연쇄구균, 대장균, 시트로박테리, 시겔라속, 폐렴간균, 엔테로박테리, 세라티아, 프로테우스, 녹농균, 헤모필루스 인플루엔자, 아시네토박테리, 캄필로박테리, 나균

(적응증)

- 도뇨염, 종기, 큰농기, 압은연조직염(단독), 연조직염, 림프관(절)염, 손발염(표지), 괴사농양, 팜생염, 집속성 여드름, 감염성 종창, 항문주위농양, 유선염, 외상, 열상, 수술상처 등의 표재성 2차감염
- 인후두염, 중이염, 부비동염, 편도염
- 급성기관지염, 만성기관지염, 기관지확장증(감염성), 만성폐쇄성질환의 2차감염, 미탄생병세기관지염, 폐렴
- sinus염, 방광염, 전립선염, 부고환염, 임균성요도염, 비임균성요도염
- 단궁염, 방광염
- 세균성 이질, 장염
- 자궁근육기염, 자궁내막염, 바르톨린선염
- 눈꺼풀염, 다래개, 누낭염, 감편선염, 각막결막
- 한센병의 병용요법

【용법·용량】

보통 성인 오픈록사신으로서 300~600 mg을 1일 2~3회 분할 복용하십시오.
한편병의 경우에는 이 약으로서 400~600 mg을 1일 2~3회 분할 복용하십시오. 원칙적으로 다른 항한센병약과 병용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

레보플록사신 등의 퀴놀론계 항균제를 투여받은 환자 중에서 외과적 수술이 필요하거나 또는 장기간의 연장을 유발하는 어거·손·아킬레스건 등의 건파열이 보고되었습니다. 시판후 조사에서는 이러한 위험성은 고령자이거나 스테로이드와 병용시 더 증가합니다. 환자가 통증, 연골, 건파열을 경험하면 이 약의 투여를 중지해야 합니다. 그리고 건염 또는 건파열이 아남을 확실한 진단받을 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가야 합니다. 건파열은 이 약 투여 중 또는 투여 후에도 나타날 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 퀴놀론계 항균제에 과민반응의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약 및 퀴놀론계 항균제로 인한 건염, 건파열의 병력이 있는 환자
- 3) 소아 및 18세 이하의 성장 중인 청소년
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 5) 글루코코르티코이드인 탈수소효소(G-6-PD) 결핍 환자(용혈반응이 나타날 수 있습니다.)
- 6) 간질 등의 경련성 질환의 병력이 있는 환자(경련의 위험이 있습니다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.

- 1) 중증 신장애 환자
- 2) 고령자
- 3) 정신질환자 또는 정신질환병력이 있는 환자
- 4) 간장애 환자

4. 이상반응

- 1) 속 : 드물게 아나필락시스 속 및 아나필락시양 반응이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 혈압강하, 호흡곤란, 충부 압박감, 발한 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 과민반응 : 때때로 발진, 가려움 드물게 발적, 부종, 발열, 열감 등의 과민반응이 나타났던 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오. 또한 수포, 홍반 등을 동반한 광과민반응이 나타났던 투여를 중지하십시오.
- 3) 신장 : 혈뇨, 드물게 급성신부전, 신결석, 간질성신염, 때때로 BUN, 혈장크레아티닌 상승이 나타날 수 있습니다.
- 4) 간장 : 드물게 황달, 간부종배달 AST/ALT, ALP, γ-GTP, 총 빌리루빈 상승, 때때로 드물게 담즙정체황달이 나타날 수 있습니다. 유사약인 레보플록사신에서 중증 간염이 보고되어 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 5) 소화기계 : 드물게 생명을 위협하는 치명적인 위막성대장염 등의 현상을 수반한 대장염이 나타나는 경우가 있으므로 복통, 빈번한 설사 등 대장염을 의심하는 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 하십시오. 때때로 구역, 구토, 위·복부불쾌감, 설사, 경변, 식욕부진, 위복부부종, 소화불량 드물게 흉통, 구갈, 미각이상, 구내염, 혀염, 복부팽만감, 변비, 연하곤란, 위장관출혈, 구강점막통, 장천공 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 혈액계 : 때때로 빈혈, 백혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크리트치 감소, 혈소판 감소, 호산구 증가, 드물게 빈혈 등이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다. 또 약물과의 인과관계는 불명확하나 드물게 무과립구증, 혈전지혈소판혈증자색변방, 점상·반상출혈, 프로트롬빈신전 연장, 가역적 골수기능억제, 림프구 감소, 호중구 감소, ESR 증가 등이 보고되었습니다.
- 7) 정신신경계 : 때때로 불면, 어지러움, 두통, 드물게 경련, 떨림, 마비감, 시각이상(복시, 무시, 안구진탕증), 청각이상(이명, 청력감소), 환각, 졸음 신경과민, 수면장애, 혼동, 불안, 우울, 초조, 다행증, 착란, 발작, 약독, 지각이상, 가려워 후각·평형감각장애, 운동실조, 설어증, 두중감 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 피부 : 드물게 피부점막만홍후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴피사성용(리델증후군)가 나타날 수 있으므로 충분히

관찰하고 이상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

- 9) 근근적계 : 드물게 관절통, 근육통, 근육약화, 근열 등이 보고 되었으며, 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 한 급격한 신기능 약화를 수반한 횡문근융해증이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 호흡기계 : 드물게 인두염, 호흡곤란, 기관지 경련, 알레르기성 폐렴, 코피, 혈작을 등이 보고 되었으며 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 간질성폐렴이 나타날 수 있으므로 주의하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질 호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 하십시오.
- 11) 순환기계 : 드물게 뇌혈전, 폐부종, 빈맥, 고·저혈압, 심계항진, 혈관확장, 순환계허탈이 보고되었습니다.
- 12) 비뇨생식기계 : 드물게 배뇨곤란, 빈뇨, 요저류, 무뇨증, 다뇨증, 혈뇨, 서상뇨, 농뇨, 당뇨, 단백뇨, 알카리뇨, 절혈, 절칸디다, 절분비물증가, 여성외음부의 가려움, 질결손, 자궁경관, 여성생식기의 발진, 통증, 자궁 및 자궁경 등이 보고되었습니다.
- 13) 기타

(1) 다른 귀לות계 항균제에서 드물게 저혈당 증상이 나타난다는 보고가 있습니다(고령자, 특히 신장에 환자에서 일어나기 쉽습니다.).

(2) 사지통, 드물게 관태감, 발열이 나타나는 경우가 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발전 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
- 2) 이 약에 의한 광과민반응을 방지하기 위해 환자는 스스로 불필요하게 강한 햇빛이나 인공적인 자외선(예를 들면 태양광선 램프, 일광욕실 등)에 노출시키지 않도록 해야 하며, 발진 등의 광과민반응이 의심되는 증상이 발생할 시 투여를 중단해야 합니다.
- 3) 중추신경계 질환(예 : 경련 역치 저하, 경련 병력, 뇌혈류 감소, 뇌구조 변화 또는 뇌졸중)의 위험요인이 있는 환자는 중추신경계 이상반응이 나타날 수 있으므로, 이를 주의시켜야 합니다.
- 4) 장기치료 시에는 정기적으로 간기능검사, 신기능검사, 혈액검사 등을 실시하십시오.
- 5) 투여 중 충분한 수분을 섭취하여 고농도의 요생성을 방지하십시오.
- 6) 이 약은 어지러움과 같은 신경학적 이상반응을 일으킬 수 있으므로, 주의를 요하는 작업이나 자동차, 기계 등을 작동할 시에는 주의하십시오.

6. 상호작용

- 1) 퀵루펜 등의 폐쇄소산제 또는 프로피온산계 비스테로이드소염제와의 병용에 의해 중추신경자극 및 경련을 일으킬 위험성이 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 2) 이 약은 와파린과 같은 경구 항응고제와 단백결합부위에서 경쟁적으로 작용하여 항응고제의 작용을 증가시켜 출혈, 프로트롬빈시간 연장 등이 나타날다는 보고가 있으므로 항응고제의 용량을 줄여야 하며, 병용 시 적절한 혈액학적 모니터링이 필요합니다.
- 3) 이 약은 시토크롬 P450 효소의 작용을 억제하므로, 시토크롬 P450으로 대사되는 약물의 혈중농도가 높아져 이들 약물의 독성이 증가할 수 있으므로 병용투여 시 주의해야 합니다.
- 4) 이 약과 테오필린과의 상호작용을 일으키지 않지만, 다른 퀵루펜계 항균제에서는 테오필린과의 병용투여 시, 테오필린의 혈중농도를 증가시키고 그 작용을 증가시킨다는 보고가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 5) 다른 퀵루펜계 항균제에서 당뇨병 치료제와 병용투여 시 저혈당증, 고혈당증 등의 혈당장애가 보고된바 있습니다. 그러므로 병용하는 경우에는 적절한 혈당 모니터링이 필요합니다.
- 6) 다른 퀵루펜계 항균제에서 시메티딘이 퀵루펜계의 배설을 방해한다는 보고가 있습니다.
- 7) 다른 퀵루펜계 항균제에서 프로메타시드는 퀵루펜계 항균제의 관 분비를 저해하여 요로감염 치료효과를 감소시킨다는 보고가 있습니다.
- 8) 다른 퀵루펜계 항균제에서 사이클로스포린의 병용투여 시 사이클로스포린의 혈중 농도가 상승한다는 보고가 있습니다.
- 9) 이 약과 혈압강화제의 병용투여 시 갑작스런 혈압강화가 나타날 수 있습니다. 혈압강화제 또는 바르비튜레이트 마취제와 병용 시에는 심혈관계 기능을 모니터링하여야 합니다.
- 10) 이 약은 식사와 상관없이 투여할 수 있습니다.
- 11) 수크랄라이트, 알루미늄 또는 마그네슘 함유 제산제, 철분 함유 제제, 칼슘 함유 제제, 아연 또는 철분이 함유된 종합비타민제와 병용에 의해 흡수가 저하되어 효과가 저하되는 경우가 있으므로 이 약 투여 전후 2시간 이내에는 병용하지 않는 것이 바람직합니다.
- 12) 이 약은 디다노신과의 병용에 의해 흡수가 저하되어 효과가 저하되는 경우가 있으므로 두 약 사이에는 2시간 이상의 투여간격을 둥니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 마십시오.
- 2) 이 약은 모유 중으로 이행되므로 이 약 투여 중에는 수유를 중단하십시오.

8. 소아에 대한 투여

- 1) 이 약은 몇몇 어린 동물종(어린 개, 어린 캣)에서 간질 이상을 유발하였습니다.
- 2) 소아 및 18세 이하의 성장 중인 청소년에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 마십시오.

9. 고령자에 대한 투여

- 이 약은 주로 신장으로 배설되는데, 고령자는 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있고 이상반응이 발생할기 쉬우므로, 용량 및 투여간격에 유의하여 신중히 투여하십시오.

10. 임상검사치에의 영향

- 이 약의 투여기간 중 아편이나 포르피린에 대한 소변검사상 위양성반응이 나타날 수 있습니다.

11. 과량투여시의 처치

- 과량투여 시에는 거의 없으나, 사고로 이 약 주사제 3g을 과량투여한 여성에서 졸음, 구역, 어지러움, 얼굴의 화끈거림, 얼굴의 부종과 마비감, 발을 부딪침, 중독도 방향감각상실 등의 이상반응이 보고되었으나, 투여 중지 후 1시간 안에 어지러움 증상을 제외하고는 모두 사라졌습니다. 급속히 과량을 투여했을 시 주의깊게 관찰을 하며 충분한 수분을 공급합니다. 이 약은 혈액투석이나 복막투석으로 완전히 제거되지 않습니다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의하십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

"약국 등의 개설자에 한하여 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 의약품 등은 본사 마케팅부(수신자부담:080-555-7171)에서 교환, 교환해 드립니다. 그리고 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백업공장 품질경영본부(수신자부담:080-333-6312)로 연락바랍니다."

작성일: 2008. 2. 2.
TD-B-0100-12-08

"이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 제일약품 홈페이지(www.jeilpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다."

제조판매원



제일약품 주식회사

본사: 서울특별시 서초구 반포동 745-5
공장: 경기도 용인시 처인구 백암면 근곡리 117-1

원료공급 및 기술제휴

DAIICHI SANKYO CO., LTD.

14-10, NIHONBASHI 3 CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103 JAPAN