작용 • 특성

코데닝정은 급 • 만성 호흡기계 질환의 대표적인 증상인 기침과 가래를 진정시키고 콧물, 코막힘, 재채기 등 호흡기계 관련 증상에 효과적인 다음 성분들이 복합 처방된 진해 거담제입니다.

*주석산 수소 디히드로 코데인 : 해소중추를 직접 억제하여 소량으로도 진해, 진통, 진경 작용을 나타냅니다.

*염산메칠에페드린 : 기침 발작으로 수축된 기관지를 이완시킵니다.

*구아이페네신 : 객담 배출을 용이하게 하는 거담작용을 갖고 있습니다.

*말레인산클로르페니라민 : 항히스타민제로서 감기로 인한 콧물, 코막힘, 재채기에 효과적이며 기타성분과 상승작용으로 호흡기계 관련 증상 개선에 도움이 됩니다.

조성 • 성상

1. 원료약품의 분량 : 매 정당

주석산 수소 디히드로 코데인(B.P.)	5mg
dl-염산메칠에페드린(K.P.)	17.5mg
말레인산 클로르페니라민(K.P.)	1.5mg
구아이페네신 (U.S.P.)	50mg

2. 성상 : 엷은 주황색의 원형정제

효능 • 효과 기침, 가래

용법 • 용량 성인 1회 2정 1일 3회 식후복용

소아용량 11세이상~15세미만 : 1~2정, 8세이상~11세미만 : 1정

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.
   1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
   2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
   3) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
   4) 심장에 장해가 있는 사람, 혈압이 높은 사람, 또는 고령자(염산페닐프로파놀아민, 염산메톡시페나민, 염산메칠에페드린, 염산에페드린, 염산슈도에페드린을 함유하는 제제)
   5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
   6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 다음 약들과 동시에 복용하지 마십시오.
      다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등
   3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.
3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
   1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
   2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
   3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
4. 보관 및 취급상의 주의
   1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
   3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 차광한 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 됩니다.

〈한외마약〉

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 적격업소 제품

® = 등록상표

L07 • 120192

8 806023 002395

사용기한:

제조번호:

전문

코데닝® 정

기침 · 가래

500정

종근당

본사 : 서울특별시 서대문구 충정로 3가 368
공장 : 충남 천안시 성거읍 오색당리 15-20
소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)