



SINCE 1945

엘도스[®] **시럽**
(에르도스테인)

전문의약품

급·만성 호흡기 질환 거담제

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.

사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

【약리기전】

1. 엘도스는 끈끈한 점액을 신속히 분해하여 담을 묽게 하고, 섬모 운동을 촉진하여 객담의 배출을 쉽게 합니다.
2. 기관지 폐포가 파괴되는 것을 막아주며 (α_1 -antitrypsin 보호작용), 호흡기 면역물질 (면역글로불린 A)의 양을 증가시키고, 인체내 생리적 항균물질리소짐, 락토페린의 양을 증가시킴으로써, **호흡기를 근본적으로 강화시키고 외부 세균에 대한 저항력을 강화** 시킵니다.
3. 엘도스는 기관지와 폐에만 집중적으로 작용하며, **위장장애가 거의 없어 장기 복용이** 가능합니다.
4. 엘도스는 **항생제와 병용시 상승작용을 발휘하여 치료기간을 단축**시킵니다.
5. 시럽 형태로 되어 있어 빠르게 흡수되며 소아에게도 정확한 용량을 투여할 수 있습니다.

【성분·함량】 - 100g 중 -

에르도스테인 (별규)7.00g

【성 상】

특이한 냄새와 맛이 있는 백색 결정성 분말로 쓸 때 물에 녹여 쓰는 시럽제

물에 현탁하였을 때는 백색의 현탁액입니다.

【효능·효과】 급만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법·용량】 -3.5%(주성분)현탁액으로서-

- 체중 15~19kg의 어린이: 1회 5mL 1일 2회 경구투여 하십시오.
- 체중 20~30kg의 어린이: 1회 5mL 1일 3회 경구투여 하십시오.
- 체중 30kg이상의 어린이 및 성인: 1회 10mL 1일 2회 경구투여 하십시오.

*엘도스 시럽 조제 방법

먼저 약을 잘 흔들어 뭉친 것을 풀어 주십시오.

이 약에 물 35mL를 가해 전량을 50mL로 만든 후 현탁시켜 사용하십시오.

통상 조제된 시럽은 실온에 보관할 때 10일간 약효의 손실없이 복용할 수 있습니다.

복용 직전 잘 흔들어서 복용하십시오.

*1일 허용량 제한

아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용)하십시오.

60kg성인 : 1일 최대복용량 2.4g (의관 65623-1652 99.9.16)

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 동성분에 과민증이 있는 환자분
- 2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자분
- 3) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전질환인 페닐케톤노증 환자분에는 투여하지 마십시오.

2. 다음의 경우에는 신중히 투여하십시오.
당뇨병 환자 및 저칼로리식이요법 중인 환자분 (본제는 백당을 함유하고 있음)
3. 이상반응
 - 1) 사용량(1200mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났습니다.
 - 2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제 3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진
4. 일반적 주의

이 약은 안식향산나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.
5. 상호작용

항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative) 등)와 병용할 수 있습니다.
6. 임부·수유부에 대한 투여

임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
7. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.

【포장단위】 1.75g(용제첨가시 50mL)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관하십시오.

【사용기간】 제조일로부터 36개월입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효(사용)기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부 고시 (소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9



주식 대웅제약

경기도 화성시 향남면 상신리 906-10



Processed under license
from

설명서 작성년월일 : 1999.09.10

설명서 개정년월일 : 2004.11.22

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자 상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.