※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

胃炎 · 胃痛 · 胃酸過多

게루삼정

GELUSAM TAB.

KGMP 적격업체제품

일반의약품
분류번호234

위내(胃內)의 산도(酸度)가 비정상적으로 높은 상태 즉 위산과다(胃酸過多) 일때 위통(胃痛)이 일어나고 소화장해(消化障害)를 일으키고 또한 위염(胃炎), 위궤양(胃潰瘍)등의 위병(胃病)을 악화(惡化)시키게 됩니다.
이 약은 위내의 과잉된 염산을 알맞게 중화(中和)하고 위점막을 피복보호하는 **건조수산화알루미늄겔**을 주제로 하고 있습니다.
이 약에는 주제인 **건조수산화알루미늄겔**의 효능을 보강하고저 산반응성(酸反應性)이 서로 다른 세가지 종류의 제산제(制酸劑)를 배합하여 빠르게, 적절하게 그리고 오랫동안 위내산도를 적당한 상태로 유지하며 위점막을 보호하게 하였습니다.

[성분 · 함량]

1정 중

건조수산화 알루미늄겔(약전)	200mg
침강탄산칼슘(약전)	100mg
탄산마그네슘(약전)	50mg
탄산수소나트륨(약전)	50mg
엘-멘톨(약전)	0.2mg

[성　　상] 백색의 원형정제

[작　　용]

1. 이 약은 위내에서 빠른 시간에 분산되어 과잉된 위산을 중화하고 위점막에흡착되어 위을 보호합니다.
2. 이러한 중화작용은 위의 활동에 지장을 초래할 만큼 진행되지 아니하고 적절한 상태에서 멈추게 됩니다.
3. 적당한 흡착작용과 수렴작용으로 위점막을 피복보호하여 상한자리에 대한 위산의 자극을 막아 줍니다.
4. 이러한 제산작용은 오랫동안 줍니다.
5. 위내 상태를 정상화시키므로 위통, 소화불량이 개선되고 위병을 치료하게 됩니다.

[효능 · 효과]

위산과다(위염,위 · 십이지장궤양에 관련된 것도 포함), 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체), 구역, 구토, 위통, 신트림
※다른 용도 사용시 심한 부작용이 나타날 우려가 있으니 주의하십시오.

[용법 · 용량]

성인 1회 2정 1일 4회 식간 및 취침시에 복용한다.

[저 장 방 법] 밀폐용기

[사 용 기 한] 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

[포 장 단 위] 100정, 200정, 1,000정, 2,000, 10,000정

※ 만약 유통과정중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국, 병원 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

삼남제약주식회사
KGMP공장 : 충남 금산군 금산읍 상리99-1
소비자 상담창구 : 041-754-3771

[사용상의 주의사항]

1. 금기

투석요법을 받고있는 환자

2. 부작용

1) 이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 장기 연용을 하지 않는다.

2) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

3) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

4) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 소아에 대한 투여

1)이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게는 투여하지 않는다.

5. 저장성의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

개정일자:030822