

위통, 속쓰림에 효과 빠른 위장약

란타시드정

LANTACID Tab.

우수의약품제조관리기준
KGMP적격지정업체
일반의약품
분류번호: 234

란타시드정은 위벽세포의 H⁺-수송체인 선택적으로 작용하는 위산분비억제제와 위산을 중화시켜주는 3가지 제산제가 이상적으로 복합제되어 위산으로 인한 위통, 속쓰림, 소화불량, 구역 등에 효과적입니다.

■성분·함량 : 1정 중

염산라니티딘(U.S.P.)	31.5mg
(라니티딘으로서 28.227mg)	
산화마그네슘(KP)	50mg
규산알루미늄산화마그네슘(KPC)	125mg
(Al ₂ O ₃ 로서 38.31mg, MgO로서 30.13mg)	
수산화알루미늄산화마그네슘(KPC)	100mg
(Al ₂ O ₃ 로서 30mg, MgO로서 30mg)	
* 총Al ₂ O ₃ 로서 68.31mg, MgO로서 110.13mg	

■성상 : 백색의 원형 필름코팅정

■효능·효과

위통, 속쓰림, 소화불량, 구역

■용법·용량

성인 (15세 이상, 80세 미만)

1회 2정씩 복용하되 복용후 5시간 이상 지나도 증상이 완화되지 않으면 다시 2정을 복용합니다.
단, 1일 2회 (4정)를 넘지 않도록 합니다.

■사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 다음 질환으로 치료 받고 있는 환자: 혈액질환, 신장·간장질환, 위·십이지장질환, 천식, 류마티스 등의 면역계 질환(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 2) 다음 약물을 투여받고 있는 환자: 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아질계 항진균제(때때로 백혈구 감소나 혈소판 감소등이 나타날 수 있습니다. 위·십이지장질환의 치료를 받고 있는 사람은 라니티딘이나 유사약이 처방되어 있을 가능성이 높기 때문에 중복복용에 조심할 필요가 있습니다.)
- 3) 적혈구 감소증, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증 등의 혈액이상의 병력이 있는 환자(혈구수의 감소가 증가될 수 있습니다.)
- 4) 히스타민 H₂-수송체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 5) 소아(15세 미만) 및 고령자(80세 이상): 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적습니다), 80세 이상의 고령자에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현될 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부: 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중 이행되므로 수유부에 투여된 경우에는 수유하지 않도록 투여하십시오.
- 7) 투석요법을 받고 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 의사의 진료를 받고 있는 환자 또는 약제를 복용중인 환자, 약물상호작용에 의해 부작용의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있습니다.
- 2) 약물에 의한 과민증의 병력이 있는 사람
- 3) 고령자(80세 이상): 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 4) 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자: 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액이상이 발생할 수 있습니다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 부작용을 은폐시킬 수 있습니다.

5) 원인불명의 체중감소가 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

6) 복통이 지속되고 있는 환자: 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있습니다.

3. 부작용

이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 발현될 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 알레르기 증상 (발진·발적, 가려움, 부종), 변비, 설사, 구토, 두통, 어지러움, 근육통 등의 증상이 나타나는 경우(염산라니티딘의 부작용 증상으로서 이들 증상이 알려져 있고, 드물게 중독한 부작용을 일으키는 경우가 있습니다.)
- 2) 이 약의 복용 후 즉시 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하게 되고, 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타나는 경우
- 3) 고열을 동반한 발진, 발적, 열에 의한 물집 등 심한 증상이 전신피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
- 4) 목의 통증, 발열, 권태감, 얼굴과 눈꺼풀의 안쪽이 하얗게 변함. 출혈하기 쉽게 됨.(잇몸의 출혈, 비출혈 등)이 나타나는 경우
- 5) 황달

4. 일반적 주의

- 1) 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 다른 질환이 있을 수 있으므로 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 2주간을 초과하여 연속하지 마십시오.
- 3) 이 약을 복용할 시에는 알콜음료는 섭취하지 마십시오.(혈중 알콜농도를 높일 수 있습니다.)
- 4) 정해진 용량을 초과하여 복용한 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 5) 기재된 효능이외의 증상에는 복용하지 마십시오.
- 6) 장기연용을 하지 않습니다.
- 7) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

5. 상호작용

- 1) 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있습니다.
테트라사이클린계 항생물질(테트라사이클린 등), new-퀴놀론계 항균제(오플록사신 등)
- 2) 이 약을 다른 위장약과 병용하지 마십시오.
다른 위장약을 동시에 병용하면 작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
임부에 대한 안전성은 확인되어 있지 않으며, 라니티딘은 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여할 경우에는 수유하지 않도록 주의하십시오.
- 7) 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용 경험은 적습니다.)
- 8) 고령자에 대한 투여(80세 이상)
80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 9) 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 습기가 적고 서늘한 곳에 보관 하십시오.
3) 오용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기간 : 제조일로부터 36개월

■포장단위 : 20정, 120정, 240정

판매원 **BORYUNG**
보령제약주식회사
경기도 안성시 안성로 123-1
www.boryung.co.kr

제조원 **(주)이텍스제약**
성명과학 연구개발 제약기업
ACTS 경기도 안성시 단원로 500-1

- * 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- * 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- * 본 제품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서를 개정연월 이후 변경된 내용은 02)2109-4260나 www.etaxpharm.com에서 확인할 수 있습니다.
- * 본 제품은 소비자 피해보상규정(재정경제부고시)에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 본 제품에 대한 의문사항은 소비자 상담실번호 (02-2109-4260)으로 문의하십시오.

개정연월 2006년 12월