[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
염산디싸이클로민(USP) ----------10mg
[저장방법] 밀폐용기
[성　　상] 흰색의 분말이 든 상 · 하 미황색의 경질캡슐제

제조번호 :

사용기한 :

※내용은 옆면에 기재할 수 있습니다.

일 반 의 약 품	분류번호 : 124

[효능 및 효과]
다음 질환에 있어서의 경련 : 위 · 십이지장궤양, 위염, 대장염, 담낭염, 게실염, 유문연축, 식도경련, 경련성 변비, 요로결석

[용법 및 용량]
성인 : 염산디싸이클로민으로서 1회 10~20mg(1-2캡슐), 1일 3~4회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 1) 녹내장 환자　2) 전립선비대에 의한 배뇨장애 환자
 3) 중증의 심질환 환자　4) 폐쇄성 요로질환 환자
 5) 유문협착 등 위장관폐색 환자　6) 마비성 장폐색 환자
 7) 장의 무긴장증 환자　8) 급성 출혈기의 불안정한 심혈관 상태 환자
 9) 이 약에 과민증 환자　10) 6개월 이하의 영아
 11) 수유부　12) 중증 근무력증 환자
 13) 중증의 궤양성 대장염 환자　14) 거대결장 환자
 15) 역류성 식도염 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 1) 자율신경병증 환자　2) 간 · 신질환 환자
 3) 고혈압 환자　4) 갑상선기능 항진증 환자
 5) 전립선비대 환자　6) 심기능장애(울혈성 심부전, 부정맥 등) 환자
 7) 고온 환경에 있는 환자　8) 궤양성 대장염 환자　9) 고령자
3. 부작용
 1) 눈 : 때때로 시조절장애, 안내압항진 등이 나타날 수 있다.
 2) 정신신경계 : 때때로 두통, 두중, 어지러움, 졸음 등이 나타날 수 있다.
 3) 소화기계 : 구갈, 변비, 때때로 설사, 묽은변, 구역 · 구토, 복부 팽만 · 불쾌감, 고장, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
 4) 순환기계 : 때때로 심계항진 등이 나타날 수 있다.
 5) 과민증 : 드물게 발진 · 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 6) 비뇨기계 : 때때로 배뇨장애가 나타날 수 있다.
 7) 기타 : 때때로 권태감, 무력감이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의 - 시조절장애, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용 - 페노치아진계 약물, 삼환계 항우울약, MAO저해제와 병용시 이 약의 항콜린 작용이 증강될 수 있으므로 주의한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 임부 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
7. 소아에 대한 투여 - 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
 고령자에는 이 약의 항콜린 작용으로 인한 구갈, 배뇨장애, 변비, 안내압항진 등의 부작용이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여한다.

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
※ 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.
본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr

스파토민 캡슐
(염산디싸이클로민)

스파토민 캡슐
(염산디싸이클로민)

*사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
* 본 표시사항은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어 주시기 바랍니다.

10캡슐

ISO9001인증업체
KGMP적격업체

진 경 제

스파토민 캡슐

Spatomin Caps.

(염산디싸이클로민)



- 위 · 십이지장궤양
- 위염 / 대장염 / 식도경련

KOSDAQ
코스닥등록법인

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

※내용은 옆면에 기재할 수 있습니다.
제조번호 / 사용기한

Rev.0